

## سؤالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

### مقاله «سیاهزخم» (Anthrax)

۱- آنزیمی بر روی کدامیک از مواد زیر اثر می‌کند؟

ب - ماکروفازها

الف - OF

د - پروتئین کیناز فعال شده میتوژن

ج - DNA

۲- پروتئینی که توسط cDNA در TEM8 انسانی رمزیابی می‌شود با کدامیک یکسان است؟

الف - Domain خارج سلولی با ۲۹۳ اسید آمینه      ب - دم کوتاه سیتوپلاسمی

د - دم ۳۶۴ اسید آمینه اول ATR

ج - دم سیتوپلاسمی

۳- در LF کدام domain در domain دیگر وارد می‌شود؟

ب - سوم به دوم

الف - اول به دوم

د - دوم به سوم

ج - چهارم به اول

۴- برای خنثی سازی بار الکتریکی در ذرات ریز کدام کشور از پایه‌های آلومنینیوم یا پودر سیلیکا استفاده می‌کند؟

ب - آمریکا

الف - عراق

د - هرسه

ج - روسیه

۵- مهارکننده اختصاصی توکسین دارای چه ساختمانی است؟

ب - پلی بنتزیل آمید

الف - پلی وینیل آمید

د - پلی آکریل آمید

ج - پلی اتیل آمید

۶- کدام دارو را می‌توان برای پیش‌گیری از آنتراکس به کار برد؟

ب - جنتامایسین

الف - پنی‌سیلین K

د - هیچ کدام

ج - سیپروفلوکساسین



۷- بعد از در معرض قرار گرفتن آنتراکس از کدام دارو استفاده می‌شود؟

- الف - داکسی سیکلین  
ب - سفتربیاکسون  
د - هیچ‌کدام  
ج - جنتامایسین

۸- میزان دوز سپیروفلوکسازین بعد از در معرض آنتراکس قرار گرفتن چه مقدار می‌باشد؟

- الف - روزی ۵۰۰ میلی گرم به مدت ۳۰ روز  
ب - روزی ۵۰۰ میلی گرم حداقل ۳۰ روز  
ج - روزی ۱۰۰ میلی گرم حداقل ۳۰ روز  
د - روزی یک گرم حداقل ۳۰ روز

۹- کدام ترکیب به عنوان واکسن آنتراکس در حال بررسی است؟

- الف - PA-کلون شده در باسیل سوبتیلیس  
ب - PA-کلون شده حاوی ژنوم باسیل آنتراسیس  
د - LF-کلون شده بوردتلاپرتوسیس  
ج - ATR-چیست؟

الف - یک پروتئین غشایی با domain از عامل آنزیماتیک

ب - یک پروتئین غشایی با domain از عامل فون ویلبراند

ج - یک پروتئین غشایی با domain از عامل LF

د - هیچ‌کدام

### مقاله «دارو درمانی بیماری اختلال توجه توأم با بیش فعالی»

۱۱- شیوع اختلال توجه توأم یا بیش فعالی (ADHD) در کودکان دبستانی چند درصد است؟

- الف - ۲۶  
ب - ۲۰  
ج - ۱۵

۱۲- شایع‌ترین دارویی مورد مصرف در درمان ADHD کدامست؟

- الف - کلوتیدین  
ب - دکستروآمفتامین  
ج - ایمیپرامین  
د - متیل فنیدات

۱۳- کدامیک از اسیدهای آمینه زیر در درمان ADHD گاهی موثر بوده است؟

- الف - ال-آرژینین  
ب - والین  
ج - ال-تیروزین  
د - میتونین

۱۴- از میان داروهای حرک زیر کدامیک از نظر کارآیی در درمان ADHD کمتر موثر است؟

- الف - بیمولین  
ب - کافئین  
ج - دکستروآمفتامین  
د - متیل فنیدات



۱۵- همه عوارض زیر با مصرف محركها دیده می شود به غیر از:

ب- افزایش آنژیمهای کبدی

الف- کاهش اشتها

د- درد معده

ج- بی خوابی

۱۶- مصرف مواد غذایی حاوی کدام ماده، همزمان با مصرف مهارکننده‌های آنژیم MAO باعث بروز

حمله فشارخون می شود؟

ب- تریپتوфан

الف- ال-تیروزین

د- همه موارد ذکر شده

ج- تیرامین

۱۷- در کدامیک از گزینه‌های زیر دو داروی آگونیست  $\alpha_2$  ذکر شده است؟

ب- (فلوکستین- گوانافسین)

الف- (کلوتیدین- متیل دوپا)

د- (گوانافسین- کلوتیدین)

ج- (پمولین ترانیل- سیپرومین)

۱۸- مناسبترین دارو- در حال حاضر- برای درمان ADHD کدام گروه می باشد؟

ب- آگونیستهای آلفا دو

الف- ضدافسردگیهای سه حلقه‌ای

د- مهارکننده‌های MAO

ج- داروهای محرك

۱۹- مهارکننده انتخابی آنژیم MAO از تیپ B کدامست؟

ب- ترانیل سیپرومین

الف- سلژیلین

د- گزینه‌های ب و ج

ج- کلرژیلین

۲۰- همه موارد زیر از فواید داروی دزیرامین به شمار می آیند به غیر از:

ب- فقدان اثر بی خوابی

الف- نیمه عمر طولانی

د- شروع اثر آنی

ج- فقدان پتانسیل اعتیاد



لطفاً از تغییر اندازه (بزرگ یا کوچک کردن) پاسخ‌نامه خودداری فرمایید **لا**  
و فتوکپی پاسخ‌ها را نزد خود نگه دارید.

## پاسخنامه ۱۱



نام و نام خانوادگی ..... استان ..... شهرستان ..... شماره نظام پذشکی .....  
تعداد پاسخهای صحیح ..... تعداد پاسخهای غلط ..... نمره به درصد ..... نمره بازآموزی .....

(د)	(د)	(ج)	(ج)	(ب)	(ب)	(الف)	(الف)	(د)	(د)	(ج)	(ج)	(ب)	(ب)	(الف)	(الف)
						۱۱								۱	
						۱۲								۲	
						۱۳								۳	
						۱۴								۴	
						۱۵								۵	
						۱۶								۶	
						۱۷								۷	
						۱۸								۸	
						۱۹								۹	
						۲۰								۱۰	