بازآموزی

سؤالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

۱ ـ مقاله «دارو درمانی آنژین صدری و سکته قلبی»

۱ ـ اولین دارویی که نشان داد قادر به کاهش مرگ و میر در آنژین ناپایدار است، کدامست.

الف ـ دی پیریدامول　　**ب** ـ آسپیرین

ج ـ ایزوسوربایددی نیترات　　**د** ـ TNG

۲ ـ در صورت مصرف همزمان داروهای ترومبولیتیک با آسپرین یا هپارین، مرگ و میر متعاقب سکته قلبی حدود چند درصد کم می‌شود.

الف ـ (۱۰ درصد)　　**ب** ـ (۳۰ ـ ۲۰ درصد)

ج ـ (۵۰ ـ ۴۰ درصد)　　**د** ـ (۹۰ ـ ۷۰ درصد)

۳ ـ کدامیک از داروهای بتا ـ بلاکر دارای اثر نسبی سمپاتومیمتیک (PAA) است.

الف ـ آسبوتولول　　**ب** ـ پروپرانولول

ج ـ آتنولول　　**د** ـ تیمولول

۴ ـ داروهای ترومبولیتیک را حداکثر تا چند ساعت پس از آغاز درد قلبی ناشی از MI باید به کار برد.

الف ـ (۱۲ ـ ۱۰ ساعت)　　**ب** ـ (۱۶ ـ ۱۴ ساعت)

ج ـ (۲۰ ـ ۱۸ ساعت)　　**د** ـ (۲۴ ساعت)

۵ ـ بیماری که یک بار از استرپتوکیناز استفاده کرده باشد، در صورت وقوع سکته قلبی مجدد (بعد از ۳ ـ ۲ سال) از کدام دارو به عنوان لخته حل کن می‌تواند استفاده کند.

الف ـ هپارین　　**ب** ـ t-PA

ج ـ Anistrelas　　**د** ـ استرپتوکینازبا دوز زیاد

۶ـ تا چه زمان قرص‌های نیتروگلیسیرین (در صورت نگهداری در شرایط مناسب و مطلوب) قابل مصرف و موثر خواهند بود.

الف ـ یک هفته
ب ـ دو هفته
ج ـ سه ماه
د ـ شش ماه

۷ـ طولانی‌ترین نیمه عمر حذفی متعلق به کدامیک از داروهای زیر است.

الف ـ تیمولول
ب ـ پروپرانولول
ج ـ نادولول
د ـ آسبوتولول

۸ـ در کدامیک از حالات آنژینی، داروهای مسدد کانال کلسیم موثرتر از بتا ـ بلاکرها به شمار می‌آیند.

الف ـ آنژین پایدار
ب ـ آنژین مخلوط (درد هنگام فعالیت و نیز استراحت)
ج ـ پرینزمتال
د ـ هیچکدام

۹ـ پدیده تحمل دارویی با مصرف درازمدت کدام دارو بروز می‌کند.

الف ـ وراپامیل
ب ـ پروپرانولول
ج ـ نیترات‌ها
د ـ دیلتیازم

۱۰ـ بیشترین مهار هدایت در گره A-V با مصرف کدام دارو ایجاد می‌شود.

الف ـ وراپامیل
ب ـ نادولول
ج ـ نیفیدیپین
د ـ ایزوسورباید

۱۱ـ در صورت وجود آنژین صدری همراه با آسم، مصرف کدامیک از داروهای زیر توصیه نمی‌شود.

الف ـ نیفیدیپین
ب ـ تیمولول
ج ـ ایزوسورباید دی نیترات
د ـ دیلتیازم

۱۲ـ در صورت وجود پدید Reynaud علاوه بر آنژین تجویز کدام دارو مناسب‌تر است.

الف ـ دیلتیازم
ب ـ نیکاردیپین
ج ـ نیفیدیپین
د ـ پروپرانولول

۱۳ـ در همه موارد زیر استفاده از بتا ـ بلاکرها توصیه شده است به غیر از:

الف ـ میگرن
ب ـ پرکاری تیروئید
ج ـ سکته قلبی
د ـ بلوک قلبی شدید

۱۴ـ در آنژین ناپایدار، دوز اولیه هپارین که به صورت یک جا (bollus) تزریق می‌شود برای یک بیمار ۷۰ کیلویی چه قدر است.

الف ـ (۲۱۰۰۰)　　ب ـ (۱۴۰۰۰)

ج ـ (۷۰۰۰)　　د ـ (۳۵۰۰)

۱۵ ـ مبتلایان به آنژین ناپایدار که علی رغم مصرف TNG زیرزبانی هنوز درد دارند یا دچار دردهای عود کننده می‌شوند برای چه مدتی نیتروگلیسیرین وریدی باید دریافت نمایند (مشروط به مراقبت از افت فشارخون)

الف ـ (۲ ساعت)　　ب ـ (۱۲ ساعت)

ج ـ (۲۴ ساعت)　　د ـ (۴۸ ساعت)

۱۶ ـ دوز مناسب هپارین باید بتواند PTT بیمار را به حدود چند ثانیه برساند.

الف ـ (۳۵ـ۳۰ ثانیه)　　ب ـ (۷۰ـ۶۰ ثانیه)

ج ـ (۱۰۰ـ۹۰ ثانیه)　　د ـ (بالای ۱۱۰ ثانیه)

۱۷ ـ کدامیک از جملات زیر صحیح نمی‌باشد.

الف ـ در آریتمی بطنی متعاقب MI، انتخاب برتیلوم توسیلات مقدم بر لیدوکائین است.

ب ـ سابقه فیبریلاسیون دهلیزی و آنوریسم، موجب رعایت احتیاط کامل در صورت تجویز وارفارین می‌شود.

ج ـ در آنژین پایدار و مزمن استفاده از آسپرین با روکش روده‌ای (EC) توصیه شده است.

د ـ در آنژین پایدار و مزمن سقف افزایش دوز آتنولول ۲۰۰ میلی گرم در روز است.

۱۸ ـ درمان با هپارین برای کدامیک از گروه‌های زیر که سکته قلبی کرده‌اند توصیه می‌شود.

الف ـ سالمندان بالاتر از ۷۰ سال با سابقه سکته قلبی

ب ـ بیمارانی که بیش از سه روز دچار بی حرکتی شده باشند

ج ـ مبتلایان به نارسایی مزمن سیاهرگی

د ـ همه موارد فوق

۱۹ ـ در کدامیک از موارد زیر برای تجویز داروی ترومبولیتیک منع مصرف نسبی وجود دارد.

الف ـ رتینوپاتی خونریزی دهنده　　ب ـ فشارخون بالاتر از $\frac{۱۲۰}{۲۰۰}$

ج ـ انجام جراحی در ۲ ماه قبل　　د ـ احتمال Pissectyion آئورت

۲۰ ـ درمان نگاهدارنده آنژین مزمن را برای کدام دسته از بیماران زیر توصیه می‌کنیم.

الف ـ عود ماهی یک بار　　ب ـ عود ماهی دو بار

ج ـ عود هفته‌ای یک بار　　د ـ عود هفته‌ای ۲ بار یا بیشتر

بازآموزی

لطفاً از تغییر اندازه (بزرگ یا کوچک کردن) پاسخ‌نامه خودداری فرمایید و فتوکپی پاسخ‌ها را نزد خود نگه دارید.

بازآموزی

پاسخنامه ۱۰

نام و نام خانوادگی ..... استان ..... شهرستان ..... شماره نظام پزشکی .....

تعداد پاسخهای صحیح ..... تعداد پاسخهای غلط ..... نمره به درصد ..... نمره بازآموزی .....

	(الف)	(ب)	(ج)	(د)		(الف)	(ب)	(ج)	(د)
۱					۱۱				
۲					۱۲				
۳					۱۳				
۴					۱۴				
۵					۱۵				
۶					۱۶				
۷					۱۷				
۸					۱۸				
۹					۱۹				
۱۰					۲۰				