بازآموزی

سؤالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

۱ ـ مقاله «فارماکولوژی در طب اطفال»

۱ ـ کدامیک از مسیرهای زیر در نوزاد فعال‌تر از بزرگسالان است؟

الف ـ دمتیله شدن　　**ب** ـ متیله شدن

ج ـ اکسیداسیون توسط سیستم سیتوکرم P450　　**د** ـ گلوکورونیداسیون

۲ ـ وراپامیل برای درمان آریتمی دهلیزی در کدامیک توصیه نمی‌شود؟

الف ـ infants　　**ب** ـ Preschool children

ج ـ School children　　**د** ـ Adults

۳ ـ کدامیک به سمیت کلیوی و گوشی جنتامایسین حساس‌تر است؟

الف ـ infants　　**ب** ـ Young children

ج ـ Adults　　**د** ـ سمیت جنتامایسین در هر سه برابر است.

۴ ـ بچه‌های کوچک در مقایسه با بزرگسالان به سمیت کدام دارو کمتر حساس هستند؟

الف ـ متوکلوپرامید　　**ب** ـ استامینوفن

ج ـ تتراسایکلین　　**د** ـ کدئین

۵ ـ اگر غلظت خونی مورد نیاز فنی‌توئین ۲۰ $\mu g/ml$ باشد دوز حمله در نوزاد سه کیلوگرمی و بچه بیست کیلوگرمی باید به ترتیب چقدر باشد؟ Vd فنی‌توئین در نوزاد 1L/Kg و در بچه بیست کیلوگرمی 0.75L/Kg است:

الف ـ ۲ و ۱۵ میلی‌گرم　　**ب** ـ ۲۰ و ۱۵ میلی‌گرم

ج ـ ۶۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم　　**د** ـ ۳۰ و ۱۵۰ میلی‌گرم

۶ ـ سرعت حذف کدام دارو در نوزاد و بزرگسال یکسان است؟

الف ـ کافئین　　**ب** ـ تئوفیلین

ج ـ کاربامازپین　　**د** ـ ایندومتاسین

۷ ـ کدامیک علی‌رغم وجود التهاب در مننژها، به CSF خوب نفوذ نمی‌کند؟

الف ـ اریترومایسین　　**ب** ـ کلرآمفنیکول

ج ـ کوتریموکسازول　　**د** ـ ریفامپین

۸ـ فاصله تزریق دوزهای جنتامایسین در نوزاد نارس باید چقدر باشد؟

الف ـ ۸ ساعت　　ب ـ ۱۲ ساعت

ج ـ ۲۴ ساعت　　د ـ ۴۸ ساعت

۹ـ دوز حمله به تناسب وزن یا سطح بدن برای اکثر داروها در چه گروه سنی کمتر از بقیه است؟

الف ـ نوزاد　　ب ـ کودک

ج ـ بزرگسال　　د ـ برای هر سه برابر است

۱۰ـ در یک کودک ۳ ماهه به وزن ۶kg و مساحت سطح بدن ۰/۳ مترمربع، با استفاده از رابطه بر مبنای مساحت سطح بدن، باید چه درصدی از دوز بزرگسال تجویز شود؟

الف ـ ۲٪　　ب ـ ۱۹٪

ج ـ ۵۰٪　　د ـ ۹۰٪

۱۱ـ نیمه عمر سولفی‌زوکسازول در کدامیک بیشتر است؟

الف ـ نوزاد　　ب ـ کودک

ج ـ بچه　　د ـ بزرگسال

۱۲ـ کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

الف ـ متابولیسم عبور اول داروها از راه رکتال بیشتر از راه اورال است.

ب ـ پوشیدن لباسهای آلوده به نفتالین در بچه‌های مبتلا به فاویسم می‌تواند باعث ایجاد آنمی همولیتیک شود.

ج ـ بچه‌ها کمتر از بزرگسالان به دیستونیای ناشی از آنتاگونیستهای گیرنده‌های دوپامینی حساس هستند.

د ـ سرعت متابولیسم تئوفیلین در بچه‌ها بیشتر از بزرگسالان است.

۲ ـ مقاله «داروهای مؤثر در درمان بیماری‌های انگلی»

۱۳ـ کدامیک از داروهای زیر موجب مهار متابولیسم مبندازول می‌گردد.

الف ـ فنوباربیتال　　ب ـ سایمتیدین

ج ـ فنی‌توئین　　د ـ رانیتیدین

۱۴ـ نشانه مشخص آلوده شدن خود به انتروبیازیس کدامست؟

الف ـ کمخونی　　ب ـ بی‌اشتهایی

ج ـ خارش مقعد　　د ـ تهوع

۱۵ـ مصرف مبندازول در کدام گروه سنی منع شده است؟

الف ـ بالای ۵۰ سال　　**ب** ـ ۱۰ـ۷ سال

ج ـ ۵ـ۳ سال　　**د** ـ زیر ۲ سال

۱۶ـ پیپرازین با کدام مکانیسم در حذف آلودگی انگلی (کرم حلقوی) مؤثر است؟

الف ـ فلج کردن کرم　　**ب** ـ از بین بردن تخم کرم

ج ـ مهار برداشت گلوکز توسط سلول‌های بدن کرم

د ـ افزایش حرکات دودی روده و اخراج کرم از بدن

۱۷ـ عبارت نادرست در مورد مبندازول کدامست؟

الف ـ تقریباً فاقد جذب سیستمیک است

ب ـ به شکل قرص‌های انتریک کوتد عرضه می‌شود

ج ـ عارضه جانبی آن اسهال و درد شکمی است

د ـ مشتق بنزایمیدازول می‌باشد

۱۸ـ طول دوره درمان با شربت پیپرازین برای رفع آلودگی به کرم‌های رشته‌ای چند روز است؟

الف ـ یک روز　　**ب** ـ سه روز

ج ـ یک هفته　　**د** ـ ده روز

۱۹ـ مهار فسفوریلاسیون اکسیداتیو میتوکندریایی در کرم کدو توسط کدام دارو صورت می‌گیرد؟

الف ـ پیپرازین　　**ب** ـ مبندازول

ج ـ نیکلوزامایِد　　**د** ـ هیچ کدام

۲۰ـ عبارت صحیح در مورد نیکلوزامایِد کدامست؟

الف ـ به‌صورت قرص جویدنی مصرف می‌شود

ب ـ روی تخم کرم کدو مؤثر است

ج ـ بعد از مصرف آن، تجویز مسهل ضروری نیست

د ـ بروز تشنج بعد از مصرف آن گزارش شده است

پاسخنامه ۲

بازآموزی

نام و نام خانوادگی..... کد بازآموزی

تعداد پاسخهای صحیح..... تعداد پاسخهای غلط..... نمره به درصد..... نمره بازآموزی.....

	(الف)	(ب)	(ج)	(د)		(الف)	(ب)	(ج)	(د)
۱					۱۱				
۲					۱۲				
۳					۱۳				
۴					۱۴				
۵					۱۵				
۶					۱۶				
۷					۱۷				
۸					۱۸				
۹					۱۹				
۱۰					۲۰				