

# دارودرمانی کچلی آندروژنیک

دکتر فریدون سیامکنژاد

پایدار است که به صورت خوارکی در درمان  
فشارخون‌های بالا و جدی مصرف می‌شود. این

**ماینوکسیدیل یک گشادکننده  
عروقی قوی و پایدار است که به  
صورت خوارکی در درمان  
فشارخون‌های بالا و جدی مصرف  
می‌شود.**

ماده به صورت کریستال‌های سفید یا کرم رنگ  
است که از طریق سنتز شیمیایی به دست می‌آید.  
فرمول شیمیایی آن C<sub>9</sub>H<sub>15</sub>N<sub>5</sub>O یا 2,6 -  
Diamino - 4 - piperidinopyrimidine 1 - oxide

طاسی ارثی (کچلی آندروژنیک) از دست  
دادن طبیعی مو در رابطه با بالارفتن سن است.  
این مسئله معمولاً در میان سالی اتفاق می‌افتد،  
ولی می‌تواند بلافاصله بعد از بلوغ نیز حادث  
شود.

مکانیسم دقیق بیوشیمیایی آن ناشناخته  
است، ولی باور بر این است که تحریک  
آندروجنیک در این عارضه دخیل می‌باشد. این  
عارضه معمولاً در مردان دیده می‌شود، ولی  
زن‌ها نیز ممکن است به آن مبتلا شوند.

**ماینوکسیدیل**  
ماینوکسیدیل یک گشادکننده عروقی قوی و

رشد پراکنده مجدد مو به میزان ۴۰٪ در طول ۱۲ ماه خواهد شد.

#### طرز استفاده

یک میلی لیتر از محلول ۲٪ ماینوسیدیل ۲ بار در روز و به فاصله ۱۲ ساعت، در محل مورد نظر استفاده می‌شود. مو نباید حداقل یک ساعت

است، که شکل گستردگی آن در تصویر شماره ۱ آمده است.

حلال ماینوسیدیل الكل اتیلیک است، به طوری که یک گرم آن در ۲۵ میلی لیتر الكل حل می‌شود. در آب به سختی حل گردیده، تا جایی که یک گرم آن در ۵۰۰ میلی لیتر آب حل می‌شود.

#### صرف عادی محلول


##### ماینوسیدیل (محلول٪)

باعث رشد پراکنده مجدد مو به میزان ۴۰٪ در طول ۱۲ ماه خواهد شد.

بعد از هر بار صرف شسته شود. تولیدکنندگان (نام تجاری محلول ۲٪ ماینوسیدیل) ادعای کنند که بیشترین اثر دارو در افرادی است که کمتر از ۱۰ سال قبل موهاشان را از دست داده، و وسعت ناحیه بی مو کمتر از ۱۰ سانتی متر است. چنانچه شرایط فوق فراهم باشد، محلول ۲٪ ماینوسیدیل باعث رویش مو در بیشتر از ۳ بیماران خواهد شد.

ریزش مو برای حداقل ۶ هفته و رویش مجدد آن نیز برای حداقل چهارماه قابل تشخیص نیست. موی جدید در ابتدان رم و کرک مانند است، ولی به تدریج در ۱/۳ از بیمارانی که به درمان پاسخ داده‌اند با ضخامت طبیعی رشد می‌کند.

رویش مجدد موها تا زمانی ادامه دارد که محلول ماینوسیدیل صرف می‌شود. تمام موها می‌یابند که در اثر صرف دارو مجدد آرشد کرده‌اند، به فاصله ۳ تا ۴ ماه بعد از قطع صرف دارو می‌ریزند.



تصویر ۱

#### طرز اثر

همان گونه که ذکر گردید، ماینوسیدیل یک گشادکننده مستقیم عروق محیطی قوی است که در درمان فشارخون بالا صرف می‌شود. البته صرف آن به دلیل عوارض جانبی اش محدود شده است. یکی از این عوارض جانبی، تحریک رشد مو (hypertrichosis) است، که به دلیل این خاصیت، در درمان انواعی از طاسی کاربرد دارد.

مکانیسم عمل آن ناشناخته است، اما صرف عادی محلول ماینوسیدیل (محلول ۲٪) باعث

کسانی که دچار بیماری‌های قلبی عروقی هستند، قبل از مصرف محلول ماینونکسیدیل باید مسئله را توسط پزشک خودشان کنترل نمایند.  
عوارض جانبی ماینونکسیدیل بر روی تمام سیستم‌های بدن مانند دارونما (Placebo) گزارش شده است. البته این عوارض بر روی پوست استثنایاً بوده و عوارضی از جمله تحریک پوستی، خشکی و تغییر رنگ مو در اثر مصرف ماینونکسیدیل در مقایسه با دارونما (Placebo) گزارش شده است.

#### خلاصه

محلول ماینونکسیدیل ۲٪ تنها دارویی است که برای درمان طاسی ارثی (کچلی آندروژنیک) به ثبت رسیده است. بعضی از مردم، هزینه کردن سالیانه ۲۰۰ پوند را برای یک محصول به واقع آرایشی، کاری عبث و بیهوده می‌دانند.

تولیدکنندگان محلول ماینونکسیدیل پیشنهاد می‌کنند، چنانچه بعد از یک سال درمان، هیچ مویی رویش نداشت، درمان باید متوقف شود. هزینه درمان با محلول ماینونکسیدیل در انگلستان، ماهیانه ۲۵ پوند است.

**عوارض جانبی، منع مصرف و احتیاط‌ها**  
تنها منع مصرف شناخته شده در این مورد، حساسیت به ماینونکسیدیل، یا حساسیت به حامل‌های ماینونکسیدیل در محلول‌ها یعنی اتانول یا پروپیلن گلیکول است.

تنها منع مصرف شناخته شده در این مورد، حساسیت به ماینونکسیدیل، یا حساسیت به حامل‌های ماینونکسیدیل در محلول‌ها یعنی اتانول یا پروپیلن گلیکول است.

اتanol یا پروپیلن گلیکول است. بعید به نظر می‌رسد که جذب بسیار اندک ماینونکسیدیل از طریق پوست سر با سایر مصارف موضعی، تغییری در فشارخون ایجاد کند. با این وجود

#### منابع:

1. Nathan A. Products for hair and scalp problems. Pharmaceut J. 1997; 258: 632
2. Dollery C (ed.) Therapeutic drugs. First ed. vol2. London: Churchill- Livingston; 1991: M207