

سوالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

۱ - مقاله «پره‌اکلامپسی - اکلامپس و چکونئی مقابله با آن»

۱ - پره‌اکلامپسی به طور معمول در هفته چندم حاملگی رخ می‌دهد؟

ب - دهم

الف - اول

د - هفته سی و هفتم به بعد

ج - بیستم

۲ - در نشانگان HELLP کدام یک از وقایع زیر رخ نمی‌دهد؟

ب - بالا رفتن آنزیمهای کبدی

الف - همولیز

ج - کاهش تعداد پلاکتها بیست

د - جدا شدن جفت

۳ - در پره‌اکلامپسی، خیز در کدام نواحی مشاهده می‌شود؟

ب - پاهای

الف - دستها

د - انگشت شست پا

ج - زانو

۴ - منظور از پروتئین اوری (در پره‌اکلامپسی) کدام است؟

الف - دفع ۲ میلی گرم پروتئین در هر ساعت از کلیه

ب - دفع ۳۰۰ میلی گرم پروتئین در ادرار ۲۴ ساعته

ج - دفع ۲ گرم پروتئین در ادرار ۲۴ ساعته

د - مثبت شدن تست پروتئین در ادرار

۵ - احتمال وقوع پره‌اکلامپسی در کدامیک از حالات زیر وجود ندارد؟

ب - نخستین بارداری

الف - وجود مول هیداتیفرم

د - بارداری زیر ۱۵ سالگی

ج - جنین مذکر

۶- در مورد PE عبارت نادرست کدامست؟

الف - کاهش گردش خون جفتی-رحمی ب - عارضه کبد چرب

ج - تجمع فیبرین در کلیه د - کاهش تخریب برادی کینین

۷- در اکلامپسی همه عوامل زیر می توانند مسئول بروز تشنج باشند بغير از:

الف - نفوذپذیر شدن BBB به عوامل التهاب زا

ب - ادم مغزی

ج - وازواسپاسم مغزی

د - خونریزی مغزی

۸- سقف تجویز سولفات منیزیوم در مقابله با اکلامپسی کدامست؟

الف - (۵۰۰-۲۵۰ میلی گرم) ب - (۲-۵ میلی گرم)

ج - (۱۰ گرم) د - (۱۵-۲۰ گرم)

۹- در صورت وقوع دپرسیون تنفسی بر اثر تجویز بیش از حد منیزیوم، کدام دارو را بکار می بریم؟

الف - دفروکسامین ب - گلوکونات کلسیم

ج - ادئات (EDTA)

۱۰- در مقابله با اکلامپسی اولین اقدام درمانی کدام است؟

الف - کنترل تشنج ب - اصلاح اسیدوز

د - تجویز داروهای مدر قدرتمند

ج - القاء زایمان

۱۱- داروی آلفا و بتا بلکر کدامست؟

الف - آتنولول ب - لابتالول

ج - تیمولول د - پروپرانولول

۱۲- داروی خط اول کاهش فشارخونهای ناشی از بارداری کدامست؟

الف - نیتروپروساید ب - هیدرالازین

ج - دیازوکساید د - دیلتیازم

۱۳- تجویز کدام دارو قند خون را بالا می برد؟

الف - پروپرانولول ب - نیوفدیپین

ج - دیازوکساید د - نیتروپروساید

۱۴- کدام دارو به نور حساس بوده، موقع انفوژیون باید در لفاف آلومینیومی حفاظت شود؟

الف - لابتالول ب - دیازوکساید

ج - هیچکدام د - هیدرالازین

۲ - مقاله «دارو درمانی مشکلات شایع پا»

۱۵- طول درمان عفونت قارچی پایی ورزشکاران با مشتقات ایمیدازول معمولاً چقدر است؟

- الف: سه روز
ب: یک هفته
ج: دو هفته
د: چهار هفته

۱۶- کدام دارو علاوه براثر ضد قارچی، خاصیت ضد میکروبی نیز دارد.

- الف: اسید بنزوئیک
ب: تولنفتات
ج: میکونازول
د: آن دسیلتات

۱۷- آغشته شدن لباس‌های رنگی با کدام دارو موجب سفید شدن آنها خواهد شد.

- الف: اسید سالیسیلیک
ب: بنزوئیل پراکساید
ج: تیوکونازول
د: اسید اندوسیلینیک

۱۸- نقش کلودیون در محلولهای ضد میخچه کدامست؟

- الف: حفظ اسید سالیسیلیک روی موضع
ب: افزایش نفوذپذیری اسید سالیسیلیک
ج: از بین بردن قارچها و میکروبها مستقر در موضع
د: هیچکدام

۱۹- از پودوفیلین برای درمان کدامیک از موارد زیر استفاده می‌شود.

- الف: عفونتهای قارچی پایی ورزشکاران
ب: میخچه
ج: وروکا
د: اکنه

۲۰- معمولاً برای درمان تعداد بیشتر وروکا به ترتیب چه غلظتهایی از فرمالدئید یا گلوتارآلدئید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- الف: ۱۰ درصد و ۲۰ درصد
ب: ۳ درصد و ۳۰ درصد
ج: ۲ درصد و ۱۰ درصد
د: ۱۰ درصد و ۳ درصد

توجه : لطفاً پس از پر کردن پاسخنامه، کمی آن را برای نشریه ارسال فرمائید.



پاسخنامه

نام و نام خانوادگی
تعداد پاسخهای صحیح امتیاز بازآموزی
نمره بدست صد

(د)	(ج)	(ب)	(الف)	۱۱	(د)	(ج)	(ب)	(الف)	۱
				۱۲					۲
				۱۳					۳
				۱۴					۴
				۱۵					۵
				۱۶					۶
				۱۷					۷
				۱۸					۸
				۱۹					۹
				۲۰					۱۰