بازآموزی

۷۵ سؤالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

۱ ـ کدام تتراسایکلین اثر آنتی ـ آنابولیک کمتری دارد؟

الف ـ دمکلو سایکلین

ب ـ داکسی سایکلین

ج ـ اوکسی سایکلین

د ـ تترا سایکلین

۲ ـ با مصرف کدامیک، احتمال ایجاد ranal Papillary necrosis بیشتر است؟

الف ـ آسپیرین

ب ـ پاراستامول

ج ـ آسپیرین + پاراستامول

د ـ فسفات کدئین

۳ ـ کدامیک ممکن است علت Obstructive uropathy باشد؟

الف ـ وارفارین

ب ـ استرپتوکیناز

ج ـ آسپیرین

د ـ هر سه

۴ ـ با کدامیک از طریق ایجاد همولیز، نارسایی حاد کلیوی رخ نمی‌دهد؟

الف ـ آسپیرین

ب ـ کوتریموکسازول

ج ـ ویتامین D

د ـ پریماکین

۵ ـ نفروپاتی گزانتین با مصرف کدامیک ممکن است ایجاد شود؟

الف ـ پروبنسید

ب ـ ویتامین D

ج ـ آلوپورینول

د ـ هر سه

۶ ـ کدامیک بیشتر سبب پروتئینوری با آسیب ایمونولوژیک می‌شود؟

الف ـ سدیم اوروتیومالات

ب ـ کربنات لیتیم

ج ـ آسپیرین

د ـ ایبوپروفن

۷ ـ مصرف مهار کننده‌های ACE در کدام بیمار ممکن است منجربه نارسایی برگشت ناپذیر کلیوی شود؟

الف ـ بیمار هیپرتانسیو با کلیه‌های سالم

ب ـ بیمار مبتلا به نارسایی قلبی با کلیه‌های سالم

ج ـ بیمار هیپرتانسیو و دیابتیک با میکروآلبومینوری

د ـ بیمار هیپرتانسیو با تنگی دو طرفه شریان کلیوی

۸ ـ کدامیک جزء عوامل خطر برای پیدایش نارسایی کلیوی با مهار کننده‌های ACE نیست؟

الف ـ سن کم

ب ـ مصرف همزمان با دوز بالای مدرها

ج ـ مصرف همزمان با ایندومتاسین

د ـ بیماری کلیوی از قبل موجود

۹ ـ کدامیک باعث کاهش نفریت بینابینی ناشی از داروها می‌شود؟

الف ـ آمپی سیلین

ب ـ پردنیزولون

ج ـ کوتری موکسازول

د ـ ایندومتاسین

بازآموزی

۱۰ ـ کدامیک از جملات زیر در باره Hydralazin - induced LE Syndrome صحیح است؟

الف ـ در سریع استیله کننده‌ها بیشتر دیده می‌شود.

ب ـ در آقایان بیشتر از خانمها دیده می‌شود.

ج ـ با دوزهای زیر ۳۰۰ میلی‌گرم در روز ایجاد نمی‌شود.

د ـ علائم آن شدیدتر از Spontaneous LE می‌باشد.

۱۱ ـ در باره جنتامایسین کدام جمله غلط است؟

الف ـ آسیب کلیوی ایجاد شده با آن وابسته به دوز است.

ب ـ بیماران دهیدراته بیشتر مستعد آسیب کلیوی با آن هستند.

ج ـ مصرف همزمان فروزومایدبخاطر ایجاد دیورز، سمیت کلیوی آنرا کم می‌کند.

د ـ مستقیماً ایجاد نکروز حاد لوله کلیوی می‌کند.

۱۲ ـ کدام دارو در کلیه آسیب بینابینی ایجاد می‌کند؟

الف ـ جنتامایسین

ب ـ سیکلوسیورین

ج ـ آمفوتریسین B

د ـ پلی‌میکسین B

۱۳ ـ از داروهای بیهوشی کننده زیر کدامیک بیشتر ایجاد آسیب لوله دیستال می‌کند؟

الف ـ هالوتان

ب ـ اینفلوران

ج ـ متوکسی فلوران

د ـ هر سه برابر این عارضه را ایجاد می‌کنند.

۱۴ ـ کدام تتراسایکلین خاصیت ایجاد دیابت بی‌مزه دارد؟

الف ـ دمکلو سایکلین

ب ـ داکسی سایکلین

ج ـ اوکسی سایکلین

د ـ هیچکدام

بازآموزی

۱۵ ـ $NSAID_S$ کدام نوع آسیب کلیوی را ایجاد می‌کند؟

الف ـ Acute Tubular necrosis

ب ـ Acute interstitial nephritis

ج ـ Acute Glomerulonephritis

د ـ هر سه نوع عارضه را می‌توانند ایجاد کنند.

۱۶ ـ کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

الف ـ در صورتی که برای دارویی انتقال فعال لوله‌ای وجود داشته باشد کلیرنس کلیوی آن متناسب با کلیرنس کره‌آتی‌نین آندوژن است.

ب ـ اندازه گیری غلظت کره‌آتی‌نین خون راهنمای خوبی برای GFR نمی‌باشد.

ج ـ GFR با بالا رفتن سن کم می‌شود.

د ـ غلظت پلاسمایی کره‌آتی‌نین با بالا رفتن سن، افزایش می‌یابد.

۱۷ ـ در کدامیک از شرایط زیر امکان گرفتگی عضله ساق پا در شب وجود ندارد؟

الف ـ دوران بارداری

ب ـ دوران شیردهی

ج ـ بیماران دیالیزی (کلیوی)

د ـ کاهش الکترولیتهای پلاسما

۱۸ ـ بعد از مرحله «گرفتگی» عضله ساق پا معمولاً تا چه مدتی حساس باقی می‌ماند؟

الف ـ چند دقیقه

ب ـ تا چهار ساعت

ج ـ تا ۲۴ ساعت

د ـ تا یک هفته

۱۹ ـ کدامیک از عوارض زیر با مصرف کینین رخ نمی‌دهد؟

الف ـ وزوز گوش

ب ـ اختلالات بینایی

ج ـ ترومبوسیتوپنی

د ـ سقوط فشار خون

۲۰ ـ در مورد خصوصیات کینتیکی کینین کدامیک از عبارات زیر نادرست است:

الف ـ عمر نیمه ($t_{\frac{1}{2}}$) دارو در افراد سالمند (بالای ۶۵ سال) حدود ۱۱ ساعت است.

ب ـ دارو بطور کامل از روده جذب می‌شود.

ج ـ حداکثر غلظت پلاسمایی آن ظرف ۱ تا ۳ ساعت بدست می‌آید.

د ـ درصد اتصال پروتئینی آن ۷۰ می‌باشد.

پاسخنامه

نام و نام خانوادگی ..... کد بازآموزی

تعداد پاسخهای صحیح ..... تعداد پاسخهای غلط ..... نمره به درصد ..... نمره بازآموزی .....

	(الف)	(ب)	(ج)	(د)		(الف)	(ب)	(ج)	(د)
۱					۱۱				
۲					۱۲				
۳					۱۳				
۴					۱۴				
۵					۱۵				
۶					۱۶				
۷					۱۷				
۸					۱۸				
۹					۱۹				
۱۰					۲۰				