



ترجمه: دکتر محمد مهدی کاشفی‌الاصل

با آن که ترفنادین اثر سداتیو و خواب‌آور
کمتری از آنتی‌هیستامین‌های قدیمی تر
دارد، ولی به طور معمول یک داروی
بی‌خطر می‌باشد. در دوزات بسیش از
اریترومایسین و ترفنادین نباید با یکدیگر
صرف شوند.
ترفنادین در استرالیا و در کشورهای
دیگر به طور وسیع در حال مصرف می‌باشد

فلوکستین میزان خونی داروهای روانگردان دیگر را افزایش می‌دهد

فلوکستین یک مهارکننده برداشت سروتونین می‌باشد که در درمان افسردگی استفاده می‌شود. تجویز کنندگان باید آگاه باشند که فلوکستین به طور قابل ملاحظه‌ای متابولیسم کبدی تمام داروهای ضدافسردگی سه حلقه‌ای، فنتیازین‌ها و هالوپریدول را مهار می‌کند. تداخل دارویی قابل ملاحظه است و شاید باعث افزایش میزان سرمی سایر داروهای روانگردان تا حد ۴ برابر گردد. این تداخل دارویی با افزایش علایم آسیکولینژریک، سمیت قلبی و حمله‌های ناگهانی تظاهر می‌نماید.

قابل ذکر است که این تداخلها بعد از قطع درمان با فلوکستین پدیدار می‌گردند. زیرا نیمه عمر فلوکستین طولانی (۲ تا ۳ روز) بوده و متابولیت فعل آن یعنی نورفلوکستین (۷ تا ۹ روز) نیز اثر طولانی دارد. بر این اصل، تجویز کنندگان باید آگاه باشند که چنین

۹۹ فلوکستین یک مهارکننده برداشت سروتونین است که در درمان افسردگی استفاده دارد. ۶۶

تداخلی ممکن است تا ۴ هفته بعد از قطع درمان با فلوکستین نیز رخ دهد.

منبع: Moulds RFW, Dawson A. Australian prescriber.1995; 18: 1 - 18.

حد درمانی گزارش شده است که باعث آریتمی قلبی نادر «Torsades de pointes» می‌شود. این آریتمی یک نوع اختصاصی از تاکیکاردی بطنی می‌باشد که بالقوه خیلی جدی است.

ترفنادين در واقع یک پیش دارو است که خیلی سریع به یک متابولیت فعال تبدیل می‌شود و به نظر می‌رسد غلظت‌های بالای پلاسمایی و هم چنین متابولیت فعال این دارو در ایجاد آریتمی موثر باشد. اریترومایسین از شکست متابولیت فعال ترفنادين جلوگیری می‌کند. اگر ترفنادين در حضور اریترومایسین مصرف گردد، غلظت‌های خیلی بالای پلاسمایی متابولیت فعال دارو ظاهر می‌شود.

۹۹ ترفنادين در واقع یک پیش دارو است که خیلی سریع به یک متابولیت فعال تبدیل می‌شود و به نظر می‌رسد غلظت‌های بالای پلاسمایی و هم چنین متابولیت فعال این دارو در ایجاد آریتمی موثر باشد. ۶۶

در بعضی بیماران، غلظت‌ها چنان افزایش می‌یابند که به آریتمی قلبی نامبرده مبتلا می‌شوند. خبرهایی از آریتمی قلبی نادر «torsade de pointes» در بیمارانی که ترفنادين و اریترومایسین را تواماً دریافت کرده‌اند گزارش شده است. بنابراین در نسخه‌های تجویز شده به طور معمولی دو دارو نباید با هم مصرف گرددند.