

## در یک نگاه «قسمت دهم»

۲- آمپول گاما گلوبولین، عضلانی تزریق شود. با سوالهایی که از بیمار شد، معلوم گردید که وی سابقه ناراحتی کلیه نداشته و برای اولین بار دچار این بیماری گردیده است. با توجه به اینکه آمپول آمیکاسین بعنوان آنتی بیوتیک آمینو گلوكوزید در عفونتهاي اوليه و غير پيچيده بيماري ادراري (مگر آنکه ساير آنتي بيوتيكها مؤثر نباشند)، منع مصرف دارد و با در نظر گرفتن اين نکته که بيمار فوق اولين بار دچار چنین بيماري و عفونت شده است، معلوم نیست که چرا پزشك مربوطه بدون آزمایش ساير آنتي بيوتيكها و حتى خود سفالكسيين که در نسخه تجويز شده است، از اين دارو استفاده کرده است. آيا برای شروع درمان

# نسخه نويسى

## مقدمه:


در قسمتهای قبل گفتیم که مصرف بی رویه دارو را بایستی از سرچشمme آن یعنی نسخه همکاران پزشك کنترل نمود. چنانچه این مقصود حاصل نشود و فرهنگ نسخه نويسى در ایران تغیير نیابد، هیچ ترفندی برای کنترل مصرف دارو مؤثر نخواهد بود. در این زمينه گروههای چندی از داروها را بررسی کردیم و گفتیم که چون بعضی از نسخ بایستی بصورت کلی ارزیابی شوند، لذا سر فصلی بنام نسخه های متفرقه را گشودیم. در شماره قبل یکی از این نمونه نسخه ها را بررسی کردیم که چون بحث به درازا کشید، ادامه آنرا در این شماره پی می گیریم.

## نسخه شماره ۱۸:

بيماري حدوداً سی و پنج ساله با درد شدید شکم و پهلوها به پزشك مراجعيه کرده و ايشان ابتدا بعد از معاینه به عفونت کلیه ها مشکوك شده و برای بيمار آزمایشهای اوليه را نوشته و جلسه اول معاینه خاتمه می یابد.

حدود يك هفته بعد، بيمار فوق همراه با برگه های آزمایش مجدداً به پزشك مراجعيه و به دليل عفونت کلیه، نسخه زير برای بيمار تجويز می گردد:

- ۱- آمپول آمیکاسین ۵۰۰ ميلي گرمی، هر ۱۲ ساعت يک كبسول.
- ۲- كبسول سفالكسيين ۵۰۰ ملي، هر ۶ ساعت يک كبسول.



لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است. اینک با توجه به این نکته که هم پزشک مربوطه تأثیر آنی بیوپتیک درمانی را ملاحظه نکرده و هم بجای ۵۵/۰ تا ۳/۳ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، یک آمپول ۲ میلی لیتری گامالگوبین را برای بیمار تجویز کرده است، باستی گفته شود که نقش این یک آمپول سمبولیک و نسخه پرکن بوده و پزشک با این کار نه تنها کمکی به درمان بیمار نکرده، بلکه دارو را بیهوده مصرف کرده و تنها به مصرف بی رویه دارو دامن زده است.

نسخه شماره ۱۹:

خانمی تقریباً سی و پنج ساله به داروخانه مراجعه و نسخه فوق را به دکتر داروساز ارائه میدهد. ایشان پس از مشاهده نسخه از بیمار سوال می‌کند که بیماری شما چیست؟ جواب می‌شود که به علت جوشهای چرکی صورت به پزشک مراجعه کرده است. دوباره از بیمار سوال می‌شود که آیا بیماری دیگری را به پزشک اظهار نکردید؟ پاسخ بیمار در این مورد منفی است. با توجه به این سوال و جواب، نسخه فوق را قبل از طبیعت برای بیمار، بایستی یک شونخی تلقی کنیم. چرا که اقلام داروئی موجود در آن یعنی لوسيون کلوتربیمازوول ۱۰ عدد، اریترومایسین در الکل، شامپو سلوکز ۲ عدد، قرص فوبواریتال ۱۰۰ میلی‌گرمی ۲ عدد، قرص کاربا مازپن ۲ عدد و قرص تاموکسی فن ۲ عدد، هیچ توجیه درمانی نداشته و نمی‌توان نامی بر آن نهاد. همانگونه که ملاحظه می‌کنید، این نسخه آنقدر گویا است که احتیاج به تفسیر ندارد. تنها این نکته باقی می‌ماند که تا چنین نسخه‌هایی در قلب پایتخت این مملکت نوشته شده و به بیمار ارائه می‌گردد، نه تنها سنگ روی سنگ نظام دارو درمانی این مرز و بوم بند نمی‌شود، بلکه تمام ارگانهای اجرائی نیز به سخره

سفالکسین به تهائی کفايت نمی‌کرد؟ و آیا درمان را با داروئی چنین سمی (آمینوگلوكوزیدها به دلیل ایجاد سمیت کلیوی و شنوایی معمولاً با احتیاط مصرف می‌شوند) شروع کردن، در عین عدم رعایت حال بیمار، دامن زدن به مصرف نابجا و بی‌رویه دارو و بالا بردن بی‌مورد سرانه مصرف نیست؟ اگرچه بحث پیرامون این نکته زیاد است، ولی به دلیل اینکه در قسمت آنتی‌بیوتیکها به این مسأله پرداخته‌ایم از آن می‌گذریم. در مورد گاما‌گلوبولین باستی گفته شود که این دارو جهت ایجاد اینمنی غیرفعال برای جلوگیری و یا تخفیف شدت بیماریهای عفونی نظری سرخک، هپاتیت A هپاتیت B ... مورد مصرف داشته و به عنوان درمان کمکی در بیماریهای عفونی مختلف (باکتریائی) که به خوبی به آنتی‌بیوتیک درمانی جواب نمی‌دهند، موصفات مشهد.

از طرفی در غفونتهای باکتریائی به طور کلی مقادیر تجویز شده در این مورد زیاد و بین ۵۵/۰ تا ۳/۲ میلی

نسخة شماره (١٨)

نسخه شماره (۱۹)

عاجل در این گونه موارد کرده و جلوی اینگونه طبایتها را بگیرد. چراکه در غیر این صورت معلوم نیست که ره به کجا خواهیم برداشت؟  
(ادامه دارد)

گرفته شده و سیستم پزشکی - داروئی در حد یک  
شوخی تنزل پیدا می‌کند.