

## رخداد و خبر . رخداد و خبر . رخداد و خبر

### مقدمه:

قسمت برایمان ارسال نمائید.


شیوه جدید مداوای بیماران  
متلا به سنگ کیسه صفرا  
گروهی از پزشکان متخصص  
ژاپنی برای اولین بار با استفاده از  
یک «آندوسکوپ» جدید و  
بکارگیری فشار هیدروالکتریک  
موفق شدند سنگهای داخل کیسه  
صفرا را ابتدا خرد کرده و سپس آنها  
را از بدن بیمار خارج کنند.

به گفته «هیزو متیسو سایشو»

کاروان علوم و تحقیقات به پیش  
خبری و چه بشکل رویدادهای که  
میروند و هر روز نقطه تاریکی از  
محیط پیرامون بشر را روشن ساخته  
ممکن است از زاویه اجتماعی  
مسئله، به اطلاع مخاطبین و  
خوانندگان خویش برساند. از آنجاکه  
در اختیار دانش پژوهان و تشنگان  
علم قرار میدهد. پارهای از این  
تحقیقات هنوز مراحل اولیه خود را  
طبی می‌کنند و برای رسیدن به نتیجه  
نهانی راهی بس عظیم و پیچیده را  
تفکیک دقیق این مطالب بیخشانید و  
پیش روی دارند. بخش اجتماعی  
چنانچه در این ارتباط مطالبی دارید  
که دانستن آن برای دیگر همکاران  
نشریه رازی سعی دارد تا گوشهای از  
این دستاوردها چه بصورت صرفاً

وی توضیح داد: می‌توان با استفاده از مایعات مناسب، از بیشتر موارد مرگ و میر ناشی از اسهال جلوگیری کرد. همچنین می‌توان از طریق تشخیص پیش از موعد و استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های موردنیاز، از مرگ و میر ناشی از ناراحتی‌های تنفسی پیشگیری کرد.

(مجله خبری مازمان بهداشت جهانی)




**استفاده از حشرات بعنوان غذا در کنار استفاده غذائی از قورباغه، حزلون، لاکپشت، هشتپا، اختاپوس، خرچنگ و دیگر موجودات غیرمعمول در بسیاری از کشورهای اروپائی، مگس، سوسک، زنبور و سایر حشرات نیز وارد رژیم غذایی این کشورها خواهد شد.**

براساس تحقیقات یک داشمند

**گزارشی پیرامون بیماریهای تنفسی و اسهال کودکان**  
مدیر شاخه مبارزه با بیماریهای تنفسی و اسهال سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که در جهان سالیانه ۷/۵ میلیون کودک کمتر از ۵ سال بر اثر ابتلا به ناراحتی‌های حاد تنفسی و اسهال، جان خود را از دست می‌دهند.

برفسور دانشگاه «شیبا»ی ژاپن، در روش جدید لوله خارجی آندوسکوب که دارای قطر  $1/3$  سانتیمتر است از طریق مجرای گوارشی به مجرای صفرا هدایت می‌شود، سپس لوله داخلی آندوسکوب را که دارای قطر  $0/45$  سانتیمتر قطر است از داخل لوله خارجی امتداد داده و به داخل کیسه هدایت می‌کند. پس از آن با استفاده از فشار هیدرولکتریک کلیه سنگهای داخل کیسه صفرا توسط سرآندوسکوب خرد و از محل خارج می‌شود.

تاکنون با استفاده از این روش ۱۷ بیمار ژاپنی بطور کامل مداوا شده‌اند. این متخصص معتقد است که با بکارگیری این روش میتوان سلطان مجرای کیسه صفرا را معالجه کرد.  
(خبرگزاری جمهوری اسلامی - توکیو)



عقرب‌ها شروع و نمایشگاههای  
جهت آشنازی مردم با انواع عقربها در  
مناطق مختلف برگزار کرده است.  
آخرین آمار منتشره در الجزایر  
حاکی است که تنها در یک منطقه  
جنوب حدود یکهزار نفر دچار  
عقرب‌زدگی شده‌اند که سه نفر از  
آنان جان خود را از دست داده‌اند.  
(خبرگزاری جمهوری اسلامی -  
العزیره)



### تأثیر آسپرین در جلوگیری از سکته قلبی

امکان ابتلاء به بیماری قلبی و سکته قلبی در مورد زنانی که بصورت دائم آسپرین مصرف می‌کنند کمتر است. یک گروه از محققین از مؤسسه پزشکی «هاروارد» در

مواد غذایی فرانسوی بنام «برونوکومبی» مگس‌ها و انواع سلسله تبلیغات برای پرورش و مصرف حشرات را آغاز کرده است. فوق العاده لذیذ و خوشمزه برخوردار (خبرگزاری جمهوری اسلامی - هستند، غذاهای مقوی نیز محسوب پاریس) می‌شوند.

**جمعیت حمایت از عقرب‌زدگی**  
بوستون بدنیال ۶ سال تحت نظر داشتن ۶۷۰۰۰ پرستار زن در سنین بین ۳۴ و ۶۵ سال اعلام کردند زنان بالای سن ۵۰ سال که هفتادی یک آسپرین مصرف می‌کنند الى ۶ آسپرین مصرف می‌کنند خطر سکته قلبی کمتر تهدیدشان می‌کند. در عین حال زنانیکه بیش از

دانشمند فرانسوی که چند سال بر روی حشرات برای استفاده غذایی تحقیق کرده است می‌گوید برای اروپاییان تصور خوردن مگس، مناطق صحرایی الجزایر اخیراً موریجه، سوسک و یا دیگر انواع حشرات تنها یک بی‌میلی طبیعی است اما این مسئله تنها به عادت کشور تشکیل شده است.

هدف از تأسیس این جمعیت می‌کنند، هیچگونه دفاعی در مقابل سکته قلبی ندارند. در گذشته تحقیقاتی نیز در مورد ۲۲ هزار قرص آسپرین در هفت مصرف

به عقیده «کومبی» بی‌میلی و عدم جمع‌آوری عقربها از مناطق مختلف عادت مردم به خوردن حشرات قبل و تحول آنها به انسیتو طبی پاستور رفع است. دانشمند فرانسوی که تا به حال حشرات مختلفی را برای طبخ است، این جمعیت که ریاست آنرا فردی بنام «زیرگ احمد» به عهده گرفته بود. تیجه این تحقیقات نشان داده و تقریباً انواع مختلف را نیز دارد فعالیت خود را با جمع‌آوری

قبیب در مردانی که هر دو روز یکبار ۳۲۵ میلی گرم آسپرین مصرف می کنند تا ۴۴ درصد کاهش می یابد.  
(روزنامه زود دویچه سایتونگ - آلمان)

### عفونی

عفونتها می یاشند که عفونت دستگاه ادراری و عفونت خفیف نسوج داخلی یا دریچه های قلب را سبب رابطه سکته قلبی با بیماری های می شوند.

گرچه این نتایج ثابت نمی کند که

عفونتها بطور مستقیم سبب حمله قلبی شوند، اما نتایج آن با نتایج پژوهش هایی که در سال ۱۹۸۸ در افزایش می دهد، تأیید می کند. ممالک اسکاندیناوی انجام شد و طی آن نشان داده شد که حدود یک سوم بیماران مبتلا به حمله قلبی قبل از انجام شده است یک سوم از ۵۰ بیمار مبتلا به حملات قلبی، یک ماه مشابه است.

حمله قلبی سومین عامل مهم مرگ و میر در آمریکاست. دکتر مارک فیشر دستیار مطالعات جدید در این ارتباط میگوید: آزمایش های خون نشان داده است که لخته شدن خون و اختلال در سیستم مصنوبیت بدنه در بیماران دچار حمله قلبی که قبل از مبتلا به بیماری های عفونی بوده اند، شدت بیشتری داشته است.

فیشر تأکید کرد یافته های وی بدین مفهوم نیست که هر زمان شخصی دچار زکام شود باید نگران حمله قلبی شود. وی گفت خطر حمله قلبی بدن بال عفونت در میان مردم عادی بی اندازه کم است. در این مورد من مطمئناً هیچ پیش بینی خاصی برای کسانی که مبتلا به عفونت هستند توصیه نمی کنم.  
(مجله انجمن قلب آمریکا)

سوء تغذیه و بیماری قند در جهان سوم سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد: بالا رفتن سن افراد، ابتلا به این بیماری را افزایش می دهد. مطالعات این سازمان نشان می دهنند که گسترش بیماری غیرواگیر مرض قند در کشورهای توسعه نیافته بیشتر از کشورهای پیشرفته است. تغذیه و عدم رعایت مسایل بهداشتی، عامل مؤثری در ابتلای افراد به مرض قند است.

سازمان بهداشت جهانی با تکیه بر مطالعات اخیر خود، هشدار داد: بیماری قند در کشورهای جهان سوم در حال گسترش است و باید برای مقابله با آن چاره اندیشی شود. مرض قند پیامدهای ناگواری از جمله: کوری، بیماری قلب و بیماری های عصبی را به همراه دارد و خاطر نشان می شود: سوء تغذیه یکی از مسایل اجتماعی است که دارای پیامدهای منفی همچون: خمودگی اجتماعی، پایین آمدن کارآیی نیروی انسانی و سطح آموزش و

