خودآموزی

سئوالات چهارجوابی مربوط به مقاله بازآموزی

ملکول‌های تازه دارویی در سال ۲۰۰۶ «قسمت اول»

۱ ـ کدام دارو فاقد متابولیسم کبدی است؟

الف ـ Anidulafungin
ب ـ Dasatinib
ج ـ Paliperidone
د ـ Darunavir

۲ ـ برای درمان آبسه‌های شکمی ناشی از کاندیدا، حداقل دوره درمان با «آنیدولافونژین» چند روز پس از آخرین نتیجه مثبت کشت خواهد بود؟

الف ـ ۳
ب ـ ۷
ج ـ ۱۴
د ـ ۲۸

۳ ـ در کپسول Pylera کدامیک از اجزاء زیر وجود ندارد؟

الف ـ مترونیدازول
ب ـ تتراسیکلین
ج ـ امپرازول
د ـ بیسموت

۴ ـ مصرف فرآورده‌های حاوی بیسموت موجب بروز کدامیک از عوارض زیر می‌شود؟

الف ـ سیاه شدن رنگ مدفوع
ب ـ حساسیت به نور
ج ـ طولانی شدن فاصله QT
د ـ هیپرگلیسمی

خودآموزی

۵ ـ کدام دارو به فرم افشانه‌ای برای مصرف داخل بینی عرضه شده است؟

الف ـ Lubiprostone
ب ـ Ciclesonide
ج ـ Dasatinib
د ـ Decitabine

۶ ـ متابولیت فعال Ciclesonide کدامست؟

الف ـ متوکسی ـ سیکله‌زوناید
ب ـ دز ـ سیکله‌زوناید
ج ـ هیدروکسی ـ سیکله‌زوناید
د ـ کربوکسی ـ سیکله‌زوناید

۷ ـ اولین داروی ضدویروس از دسته مهارکننده‌های پروتئاز (PIs) که توسط FDA تایید شد، کدام بود؟

الف ـ Saquinavir
ب ـ Indanavir
ج ـ Nelfinavir
د ـ Ritonavir

۸ ـ در مورد «داروناویر» کدام عبارت نادرست است؟

الف ـ فراهمی زیستی آن در صورت مصرف هم‌زمان با «ریتوناویر»، به‌صورت چشمگیری افزایش پیدا می‌کند.
ب ـ توصیه شده که دارو حتماً با غذا مصرف شود.
ج ـ راه اصلی دفع آن از طریق کلیه و به وسیله ادرار است
د ـ نیمه عمر حذفی دارو، در صورت تجویز هم‌زمان آن با «ریتوناویر»، ۱۵ ساعت است.

۹ ـ شایع‌ترین عارضه جانبی Dasatinib کدامست؟

الف ـ کاهش قند خون
ب ـ تضعیف شدید مغز استخوان
ج ـ حساسیت به نور
د ـ اسپاسم برونش

۱۰ ـ مصرف هم‌زمان Dasatinib با کدام دارو موجب کاهش غلظت پلاسمایی Dasatinib می‌شود؟

الف ـ کتوکونازول
ب ـ اریترومایسین
ج ـ ریتوناویر
د ـ ریفامپین

خودآموزی

۱۱ ـ Lubiproston را برای درمان کدام اختلال ایدیوپاتیک به‌کار می‌برند؟

الف ـ یبوست مزمن
ب ـ اسهال شدید
ج ـ زخم دوازدهه
د ـ خونریزی رحمی

۱۲ ـ نام تجارتی دارویی که با فعال کردن کانال کلر اثرات درمانی خود را اعمال می‌کند چیست؟

الف ـ Dacogen
ب ـ Sprycel
ج ـ Prezista
د ـ Amitiza

۱۳ ـ Palipridone می‌تواند همه عوارض جانبی زیر را ایجاد کند به غیر از:

الف ـ آکاتیزیا
ب ـ تاکیکاردی سینوسی
ج ـ بی‌خوابی
د ـ خونریزی بینی

۱۴ ـ کدام دارو در پلاسما به AAG یا Alfa-1-acid-glycoprotein متصل می‌شود؟

الف ـ پالی‌پریدون
ب ـ سیکله‌زوناید
ج ـ داروناویر
د ـ لوبی‌پریستون

۱۵ ـ عبارت درست در مورد Paliperidon کدامست؟

الف ـ پیش دارویی است که در بدن به فرم فعال خود تبدیل می‌شود.
ب ـ غذا موجب کاهش جذب آن می‌شود.
ج ـ برای درمان مبتلایان به اسکیزوفرنی که ۱۸ سال به بالا سن دارند مصرف می‌شود.
د ـ برای مصرف در سالمندانی که دچار سایکوز مرتبط با دمانس شده‌اند، تایید گردیده است.

لطفاً از تغییر اندازه (بزرگ یا کوچک کردن) **پاسخنامه خودداری فرمایید و فتوکپی پاسخ‌ها را نزد خود نگه دارید.**

پاسخنامه ۱۱

نام و نام‌خانوادگی ..... استان ..... شهرستان ..... شماره نظام پزشکی .....

تعداد پاسخ‌های صحیح ..... تعداد پاسخ‌های غلط ..... نمره به درصد ..... نمره بازآموزی .....

	(الف)	(ب)	(ج)	(د)		(الف)	(ب)	(ج)	(د)
۱					۱۱				
۲					۱۲				
۳					۱۳				
۴					۱۴				
۵					۱۵				
۶					۱۶				
۷					۱۷				
۸					۱۸				
۹					۱۹				
۱۰					۲۰				