

سؤالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

کم مقاله داروهای جدید تایید شده توسط FDA در سال ۲۰۰۳ «قسمت دوم»

۱_درباره Bulimia nervosa کدام جمله صحت ندارد؟

الف ـ حملات غير قابل كنترل پرخورى دارند.

ب رفتار جبرانی نامناسب برای جلوگیری از افزایش وزن دارند.

ج ـ آقایان بیشتر از خانمها به آن مبتلا می شوند.

د اختلال در سیستم سروتونرژیک و عوامل ژنتیکی می تواند علت بیماری باشد.

۲ ـ در بیماران مبتلا به بولیمیا که از purging به روش ایجاد استفراغ و سوء مصرف مدرها استفاده می کند کدامیک در خون او افزایش می یابد؟

الف_ پتاسيم ب_ كلرايد

ج۔ بیکربنات د۔ هیچ کدام

۳ کدامیک برای کم کردن Leg edema ناشی از سیندرم بارتر کاذب در بیماران مبتلا به بولیمیا سودمند واقع نمی شود؟

الف_اسپيرونولاكتون ب_ فروزومايد

ج ـ غذای کم نمک داشتن پاها

۴ ـ کاهش پتاسیم خون به اندازه یک میلی مول در لیتر نشان دهنده دفع چه مقدار پتاسیم از بدن

است؟

الف- ۱ میلی مول

ج ـ ۵۰ میلی مول د ـ ۵۰ میلی مول



۵ کدام دارو برای درمان بولیمیانرووزا توسط FDA تایید شده است؟

ب ـ فلوكستين

الف ـ ایمی پرامین

د ـ بوپروپيون

ج ـ ترانیل سیپرومین

۶ موثرترین و مناسب ترین دوز فلوکستین برای درمان بولیمیانرووزا چقدر بوده است؟

د_ ۴۰ mg

۱لف_۲۰ mg

د_ ۸۰ mg

۶۰ mg_ج

۷ ـ کدامیک از داروهای ضد افسردگی زیر می تواند در درمان پرخوری عصبی سودمند باشد؟

ب ایمیپرامین

الف ـ دزيپرامين

د۔هر سه

ج ـ فلوكستين

Bulimia nervosa_∧ در کدامیک بیشتر محتمل است؟

الف-خانم پرخور در هر سنی

ب خانم پرخور ۲۰ ـ ۱۸ ساله با هیپوکالمی، آلکالوز متابولیک

ج ـ خانم پرخور ۴۵ ـ ۴۰ ساله

د ـ آقای پرخور ۲۰ ـ ۱۸ ساله با هیپوکالمی و اسیدوز متابولیک

٩ ـ كداميك از داروهاى زير در درمان بوليميا سودمند واقع شده است؟

ب ـ توپى رامىت

الف ـ كربنات ليتيم

دـهر سه

ج ـ اوندانسترون

۱۰ ـ برای رساندن ۸۰ میلی اکی والان پتاسیم در روز به بیمار او باید روزانه چه مقدار کلرید پتاسیم دریافت کند؟

ب ع گرم

الف-٣ گرم

د_۱۲ گرم

ج ـ ٩ گرم



لطفاً از تغییر اندازه (بزرگ یا کوچک کردن) پاسخ نامه خودداری فرمایید و فتوکپی پاسخ ها را نزد خود نگه دارید.

| پاسخنامه ۱۱ خورآموزی | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-----|--------------|---------------------------|-----------|------|------------------|--|
| | | | .شـــرسـتان | | ا س | گی | نام و نام خانواد | |
| (7) | ره بازآموز <i>ی</i> . (ج) | (ب) | نمره به درصد | خ های غلط (د) | تعداد پاس | صحیح | تعداد پاسخ های | |
| | | | | | | | \ | |
| | | | 17 17 | | | | Y | |
| | | | 14 | | | | * | |
| | | | \a | | | | a | |
| | | | \psi | | | | <i>۶</i> | |
| | | | \V | | | | v | |
| | | | \\A | | | | ^ | |
| | | | 19 7• | | | | | |
| | | | | | | | | |



نظرسنجي مقالات بازأموزي

ارزشیابی مقاله خوداَموزی پرخوری عصبی یا بولیمیانرووزا و روشهای درمان آن

شماره ۱، بهمن ۸۳، صفحات ۸ تا ۱۳

| (1)* (Y) (Y) (F) (\(\Delta\))** |
|--|
| 1 ـ محتوای مقاله با اهداف خوداًموزی مطابقت داشت. |
| ۲ ـ مقاله از ساختار مناسبي برخوردار بود. |
| ۳ ـ نیاز علمی مخاطب در مقاله رعایت شده بود. |
| ۴ ـ مقاله برای خواننده مفهوم بود. |
| 🛕 ـ مندرجات مقاله موجب افزایش یا یاداًوری اطلاعات خواننده می شد. 📗 📗 📗 💮 |
| ۶ ـ مقاله افق جدیدی برای خواننده در مورد کارهای رایج پزشکی یا داروسازی |
| بهوجود می آورد. |
| ۷ ـ سؤالات خوداًموزى متناسب با مقاله طراحى شده بودند. |
| *(۱) ـ قسمت اول به معنای: کاملاً مخالف می باشم.**(۵) ـ ستون پنجم به معنای: کاملاً موافق هستم. |
| ستونها <i>ی</i> مابین حد وسط اظهار نظر می باشند. - |
| ✔ پیشنهاد شما در مورد این مقاله چیست ؟ |
| · · |
| (لطفاً در صورت لزوم به اختصار بنویسید). |
| |
| |
| |