خودآموزی

سؤالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

داروهای جدید در سال ۲۰۰۴ «قسمت دوم»

۱ـ طول اثر انسولین گلولیزین چند ساعت است؟

الف ـ دو
ب ـ سه
ج ـ پنج
د ـ ده

۲ـ Iloprost آنالوگ صناعی کدام پروستاگلاندین زیر محسوب می‌شود؟

الف ـ D
ب ـ E
ج ـ $F_{2\alpha}$
د ـ I_2

۳ـ راه تجویز داروی ایلوپروست در مبتلایان به هیپرتانسیون ریوی کدام است؟

الف ـ خوراکی
ب ـ استنشاقی
ج ـ ترانس‌درمال
د ـ هیچ‌کدام

۴ـ در مراحل پیشرفته نارسایی کلیه از کدام دارو برای ممانعت از جذب فسفات (از دستگاه گوارش) استفاده می‌شود؟

الف ـ لانتانوم
ب ـ Pegatanib
ج ـ Pregubalin
د ـ سولفیناسین

خودآموزی

۵ـ در مقابل کدام دارو عارضه جانبی ذکر شده ارتباطی با آن دارو ندارد؟

الف ـ ایلوپروست (دوار سر) **ب ـ** تینیدازول (طعم فلزی در دهان)

ج ـ تلی‌ترومایسین (اسهال) **د ـ** سولیفناسین (تکرر ادرار)

۶ـ کدام دارو به‌صورت قرص جویدنی به بازار عرضه شده است؟

الف ـ Pemetrexed **ب ـ** Lanathanum

ج ـ Iloprost **د ـ** تینیدازول

۷ـ برای کاهش تری‌گلیسرید پلاسما کدامیک از کارهای زیر باید انجام شود؟

الف ـ انجام ورزش **ب ـ** کاهش وزن

ج ـ تعدیل رژیم غذایی **د ـ** همه موارد فوق

۸ـ همه عوامل زیر می‌توانند موجب افزایش تری‌گلیسرید پلاسما بشوند به غیر از:

الف ـ دیابت **ب ـ** پرکاری تیرویید

ج ـ چاقی **د ـ** مصرف مدرهای تیازیدی

۹ـ داروی Pegapatanib با چه مکانیسمی عمل می‌کند؟

الف ـ فعال کردن فاکتور رشد اندوتلیال عروق

ب ـ فعال کردن فاکتور رشد اپیدرمال

ج ـ مهار کردن فاکتور رشد اندوتلیال عروق

د ـ مهار کردن فاکتور رشد اپیدرمال

۱۰ـ پروتئین VEGF با همه مکانیسم‌های زیر به غیر از یکی موجب نابینایی در افراد مستعد می‌شود آن یک مکانیسم کدام است؟

الف ـ القا آنژیوژنز **ب ـ** افزایش نفوذپذیری عروق

ج ـ تخریب مرکز بینایی در مغز **د ـ** بروز التهاب

۱۱ـ نیمه عمر پلاسمایی Pegapatanib چقدر است؟

الف ـ ۳۰ دقیقه **ب ـ** ۲۴ ساعت

ج ـ سه روز **د ـ** ده روز

خودآموزی

۱۲ـ اعمال اثر درمانی Pemetrexed از طریق مهار همه آنزیم‌های زیر صورت می‌گیرد به غیر از:
الف ـ دی‌هیدروفولات ردوکتاز
ب ـ GARFT
ج ـ دی‌آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز
د ـ تیمدیلات سینتاز

۱۳ـ عبارت نادرست در مورد داروی Pemetrexed کدام است؟
الف ـ تضعیف مغز استخوان یک عارضه جدی دارو به شمار می‌آید
ب ـ کلیرانس کرآتینین کلیوی بیماران نباید کمتر از ۴۵ml/min باشد
ج ـ در صورت مصرف هم‌زمان با پروبنسید، کلیرانس کلیوی دارو زیاد می‌شود
د ـ تجویز هم‌زمان اسید فولیک و ویتامین B_{12} موجب کاهش بعضی از عوارض دارو می‌شود

۱۴ـ کدام عبارت در مورد املاح Pentatate صحیح ذکر شده است؟
الف ـ در صورت مسمومیت با پلوتونیم، ابتدا ملح Zn و سپس مشتق کلسیم DTPA مورد استفاده قرار می‌گیرد
ب ـ کارایی شلات کنندگی این داروها در طول زمان کاهش می‌یابد
ج ـ ملح روی (Zn–DTPA) نسبت به ملح کلسیم آن سمیت بیشتری دارد
د ـ در صورت آلوده شدن فرد با مواد رادیواکتیو و پس از تجویز شلاتورهای DTPA، بایستی مصرف مایعات محدود شود

۱۵ـ در درمان اسهال‌های مسافرتی ناشی از E.coli کارآیی Rifaximin مشابه کدام دارو خواهد بود؟
الف ـ آمپی‌سیلین
ب ـ دیفنوکسیلات
ج ـ جنتامایسین
د ـ سیپروفلوکساسین

۱۶ـ داروی پرگابالین می‌تواند مجب بروز هر یک از عوارض زیر بشود به غیر از:
الف ـ خشکی دهان
ب ـ کاهش وزن
ج ـ اِدِم محیطی
د ـ تاری دید

خودآموزی

۱۷ـ کدام دارو یک آنتی‌بیوتیک کتولیدی محسوب می‌شود؟

الف ـ Telitromycin
ب ـ Erythromycin
ج ـ Sulfenacin
د ـ هیچ کدام

۱۸ـ عبارت نادرست در مورد تینیدازول کدام است؟

الف ـ مصرف این دارو در سه ماهه اول حاملگی منع شده است

ب ـ این دارو موجب مهار سنتز پروتئین از طریق اتصال به ساب یونیت ۵۰S ریبوزومی میکروارگانیسم‌ها می‌شود

ج ـ دارو برای درمان ژیاردیا و نیز تریکومونا توصیه می‌شود

د ـ مصرف این دارو با الکل یا فرآورده‌های دارویی حاوی الکل موجب بروز ناسازگاری و عوارض جدی دارویی می‌شود

۱۹ـ Sulifenacin برای کدامیک از موارد زیر تجویز می‌شود؟

الف ـ مثانه پرتحرک
ب ـ برونشیت مزمن وخیم
ج ـ آبسه کبدی
د ـ دردهای نوروپاتی

۲۰ـ Ketec نام تجارتی کدامیک از داروهای زیر است؟

الف ـ تینیدازول
ب ـ Rifaximin
ج ـ Pregubalin
د ـ تِلی‌ترومایسین

خودآموزی

لطفاً از تغییر اندازه (بزرگ یا کوچک کردن) پاسخ نامه خودداری فرمایید و فتوکپی پاسخ ها را نزد خود نگه دارید.

خودآموزی

پاسخنامه ۵

نام و نام خانوادگی ..... استان .....شهرستان ..... شماره نظام پزشکی .....

تعداد پاسخ های صحیح ..... تعداد پاسخ های غلط ..... نمره به درصد ..... نمره بازآموزی .....

	(الف)	(ب)	(ج)	(د)		(الف)	(ب)	(ج)	(د)
۱					۱۱				
۲					۱۲				
۳					۱۳				
۴					۱۴				
۵					۱۵				
۶					۱۶				
۷					۱۷				
۸					۱۸				
۹					۱۹				
۱۰					۲۰				

خودآموزی

نظرسنجی مقالات بازآموزی

ارزشیابی مقاله خودآموزی

داروهای جدید در سال ۲۰۰۴ «قسمت دوم»

شماره ۱۰، آبان ۸۴، صفحات ۶ تا ۲۶

	(۱)*	(۲)	(۳)	(۴)	(۵)**
۱ـ محتوای مقاله با اهداف خودآموزی مطابقت داشت.	☐	☐	☐	☐	☐
۲ـ مقاله از ساختار مناسبی برخوردار بود.	☐	☐	☐	☐	☐
۳ـ نیاز علمی مخاطب در مقاله رعایت شده بود.	☐	☐	☐	☐	☐
۴ـ مقاله برای خواننده مفهوم بود.	☐	☐	☐	☐	☐
۵ـ مندرجات مقاله موجب افزایش یا یادآوری اطلاعات خواننده می‌شد.	☐	☐	☐	☐	☐
۶ـ مقاله افق جدیدی برای خواننده در مورد کارهای رایج پزشکی یا داروسازی به‌وجود می‌آورد.	☐	☐	☐	☐	☐
۷ـ سؤالات خودآموزی متناسب با مقاله طراحی شده بودند.	☐	☐	☐	☐	☐

(۱)ـ** قسمت اول به معنای: کاملاً مخالف می‌باشم. *(۵)ـ** ستون پنجم به معنای: کاملاً موافق هستم.

ستون‌های مابین حد وسط اظهار نظر می‌باشند.

پیشنهاد شما در مورد این مقاله چیست ؟

(لطفاً در صورت لزوم به اختصار بنویسید).

.....

.....

.....

پی‌در پی ۱۹۰/ ۸۷۰