



توصیه‌های یک داروساز

دکتر شیما حتم‌خانی، دکتر سپیده الیاسی

مرکز اطلاع‌رسانی دارو پزشکی، داروخانه‌های دانشکده داروسازی دانشگاه تهران

شده است (۵۰۰mg هر ۸ ساعت خوراکی) بعد از مصرف اولین دوز دارو، بیمار دچار واکنش‌های حساسیتی (خارش، قرمزی و کهیر، در کل بدن حتی کف دست‌ها) شده است، بعد از مراجعه به اورژانس اقدامات لازم انجام شده و عارضه برطرف گردیده است. بیمار حدود شش ماه قبل برای درمان هلیکوباکتر مترونیدازول، مربوط به کارخانه‌ای دیگر مصرف می‌کرده البته همراه با اومپرازول و آموکسی‌سیلین و هیچ عارضه‌ای برای وی ایجاد نشده است، ولی بعد از تکرار داروها و مصرف مترونیدازول ساخت کارخانه‌ای دیگر عوارض مشابهی ظاهر گردیده است (کارخانه سازنده آموکسی‌سیلین و اومپرازول تغییر نکرده بود). داروی دیگری که برای این بیمار تجویز

■ ADR مرکز اطلاع‌رسانی داروخانه ۱۳ آبان
□ ایجاد واکنش‌های حساسیتی با شربت
دای‌سیکلومین

برای پسر بچه‌ای ۴ ساله با وزن ۱۱ کیلوگرم به دلیل دل‌درد، شربت دای‌سیکلومین تجویز شده است، کودک چند ساعت بعد از خوردن یک پیمانه از این شربت دچار واکنش‌های شدید التهابی (خارش کهیر، راش و ...) گردیده است. بیمار سابقه آلرژی بیماری ارثی و نقص آنزیمی نداشته و هیچ داروی دیگری استفاده نمی‌کرده است.

□ ایجاد واکنش‌های حساسیتی با قرص
مترونیدازول

برای خانمی ۴۵ ساله با وزن ۵۶ کیلوگرم به دلیل عفونت واژینال قرص مترونیدازول تجویز

شده بود، کرم واژینال Clotrimazol بود که بیمار استفاده نکرده بود (هر ۲ بار که عارضه ایجاد شده، مترونیدازول ساخت یک کارخانه بوده است).

□ ایجاد سندروم استیون جانسون با قرص لاموتریزین

برای بیمار به دلیل مشکلات عصبی داروی لاموتریزین ۱۰۰mg، روزی یک عدد به همراه قرص تری هگزیفنیدیل و سدیم والپروات به صورت (TDS) و آلپرازولام شبی یک عدد تجویز شده است. داروی لاموتریزین به تازگی به داروهای بیمار اضافه شده و بقیه را قبلاً هم مصرف می کرده است. به فاصله یک هفته از مصرف لاموتریزین ابتدا راش و خارش در ناحیه پوست سر ایجاد شده و به مرور افزایش یافته، بافت‌های مخاطی هم درگیر می شوند و در نهایت با تشخیص سندروم استیون جانسون، بیمار بستری می شود.

Medical error: بعد از بروز علائم و مشکلات پوستی، به اشتباه، این بیمار با تشخیص عفونت سیستمیک بستری شده و برای وی آنتی بیوتیک تجویز کرده اند. (بعد از سه روز آنتی بیوتیک درمانی و عدم بهبود بیمار مشخص می شود سندروم استیون جانسون بوده است).

■ اطلاعیه شماره ۷۶ مرکز ADR ایران

با توجه به اشتراک بعضی مواد در داروهای مورد استفاده در رفع علائم سرماخوردگی و سرفه، لیست محتویات این داروها جهت یادآوری و پیش گیری از overdose ارائه می گردد.

■ شربت دکسترومتورفان: ۱۵ میلی گرم دکسترومتورفان هیدروبروماید در هر ۵ میلی لیتر.

■ شربت دکسترومتورفان - پی: ۱۵ میلی گرم دکسترومتورفان هیدروبروماید و ۳۰ میلی گرم سودوافدرین در هر ۵ میلی لیتر.

■ قطره دکسترومتورفان: ۴ میلی گرم دکسترومتورفان هیدروبروماید در هر میلی لیتر.

■ شربت دیفن هیدرامین: ۱۲/۵ میلی گرم دیفن هیدرامین هیدروکلراید در هر ۵ میلی لیتر.

■ شربت دیفن هیدرامین کامپاند: ۱۲/۵ میلی گرم دیفن هیدرامین هیدروکلراید و ۱۲۵ میلی گرم آمونیوم کلراید در هر ۵ میلی لیتر.

■ شربت اکسپکتورانت: ۱۰۰ میلی گرم گایافنزین ۲ میلی گرم کلرفنیرامین مالئات و ۳۰ میلی گرم سودوافدرین در هر ۵ میلی لیتر.

■ قرص سرماخوردگی کودکان: ۸۰ میلی گرم استامینوفن، ۵/۰ میلی گرم کلرفنیرامین مالئات و ۷/۵ میلی گرم سودوافدرین.

■ شربت سرماخوردگی کودکان: ۰/۷۶ میلی گرم کلرفنیرامین مالئات و ۱۰ میلی گرم سودوافدرین در هر ۵ میلی لیتر.

■ شربت کلرفنیرامین: ۲ میلی گرم کلرفنیرامین مالئات در هر ۵ میلی لیتر.

■ شربت گایافنزین: ۱۰۰ میلی گرم گایافنزین در هر ۵ میلی لیتر.

