

در کشورهای دیگر ۸ نوع واکسن تزریق می‌شود یعنی از ۱۹۴ کشور بالغ بر ۱۸۶ کشور از فراوانی تزریق واکسن به خصوص واکسن جلوگیری از بیماری منتزیت استفاده می‌کنند و کشور ما جزو ۸ کشوری به حساب می‌آید که از این نوع واکسن‌ها بهره‌مند نیست.

چندی قبل دکتر محمدرضا بلورساز عضو انجمن پزشکان کودکان ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس اظهار داشت: «در ایران نوزادان و شیرخواران فقط علیه واکسن‌های سل، دیفتتری، کزاز، سیاه سرفه، سرخک، سرخجه، اوریون، هپاتیت B آنفلوانزا و واکسن فلج واکسینه می‌شوند و این در حالی است که واکسن هپاتیت A، ابله مرغان روتاویروس، منگوکوک، پنوموکوک و هموفیلوس آنفلوانزا جزو واکسن‌های طرح ملی واکسیناسیون

### ■ واکسیناسیون در ایران اسفبارتر از افغانستان

یکی از همکاران داروساز که مایل نبودند نامشان ذکر شود، طی نامه‌ای برای ماهنامه دارویی رازی از اوضاع بد واکسیناسیون در ایران گله کرده‌اند و چنین نوشته‌اند:

«... این اوضاع آن چنان بد است که جناب آقای دکتر مرندی هم به صدا درآمده‌اند و در خبری که خبرگذاری مهرورزی در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۲ ذکر کرده‌اند گفته‌اند که:

هنوز هم در کشور برنامه واکسینی که بنده در دوران وزارت به اجرا در می‌آوردم، انجام می‌شود. در حالی که کشورهای افغانستان و سومالی نیز بهتر از ما در زمینه واکسن اقدام کرده‌اند، زیرا ما فقط ۳ واکسن به کودکانمان تزریق می‌کنیم ولی

نوزادان و کودکان قرار ندارند و فقط برخی پزشکان مراکز خصوصی برای واکسینه کردن این قبیل واکسن‌ها برای مراجعان خود اقدام می‌کنند.» وی افزوده: «از آنجایی که تزریق این واکسن‌ها با هدف افزایش ایمنی بدن در برابر انواع بیماری‌های عفونی صورت می‌پذیرد، تزریق نکردن این واکسن‌ها سبب ابتلا به بیماری‌های عفونی و تحمیل مخارج درمان به خانواده‌ها و دولت می‌شود از این رو، ضرورت گنجاندن این واکسن‌ها در طرح ملی واکسیناسیون به شدت احساس می‌شود.»

به گفته وی، مصون نبودن در برابر ویروس آبله مرغان توسط واکسن سبب ابتلا به این بیماری می‌شود که در سنین جوانی، نوجوانی و بزرگسالی گاه با عوارض بسیار شدیدی از قبیل التهاب بافت‌های مغزی (مننژوآنسفالیت) همراه است که ضرورت تزریق این واکسن در کشور در قالب طرح واکسیناسیون احساس می‌شود. بلورساز با اشاره به این مطلب که تزریق نکردن دو واکسن مننژوکوک و پنوموکوک نیز سبب بروز عوارضی از قبیل مننژیت، التهاب گوش (اوتیت) سینوزیت، گرفتگی و خشونت صدا (لارنژیت) سینه‌پهلو (پنومونی)، عفونت‌های مفصلی و استخوانی می‌شود، افزوده: «خودداری از تزریق واکسن هپاتیت A در سنین زیر ۵ سال به ویژه در کودکان زیر ۲ سال باعث ابتلا به هپاتیت A و زردی خطرناک و کشنده در کودکان می‌شود و همچنین نبود واکسن روتاویروس سبب اسهال‌های زمستانی در شیرخواران و کودکان می‌شود که گاه مرگ آنان را به همراه دارد.»

کوشانفر در مورد واکسن آبله مرغان هم

می‌افزاید: «اگر واکسن آبله مرغان دو بار به کودکان تزریق شود دیگر به این بیماری مبتلا نمی‌شوند ولی در ایران به علت نبود این واکسن کودکانی که مبتلا می‌شوند علاوه بر عوارض پوستی دچار عوارض دیگری می‌شوند این در حالی است که کودکان مبتلا باید یک تا دو هفته در منزل بستری شوند و این مسأله باعث افت تحصیلی در کودکان می‌شود. البته، از دو سالگی به بعد هم این واکسن یک‌بار بعد از دو سالگی تزریق می‌شود البته واکسن‌های دیگری هم چه ویروسی، چه میکروبی و حتی واکسن ایدز و سایر بیماری‌های دیگر در حال بررسی و تهیه است.» وی در مورد بیماری مننژوکوک هم خاطرنشان می‌کند: «مننژوکوک بیماری است که در کودکان باعث ایجاد بیماری‌های تنفسی می‌شود و در بعضی مواقع باعث ایجاد مننژیت می‌شود این در حالی است که عوارض این بیماری بسیار خطرناک است و متأسفانه آمار این بیماری هم در کشور زیاد است و از علایم این بیماری می‌توان به وجود لکه‌های خون روی بدن اشاره کرد. این بیماری خطرناک است، واکسن آن در ایران موجود است و فقط مختص کسانی است که به حج می‌روند از این رو توصیه می‌شود این واکسن به کودکان تزریق شود.»

و این شمه‌ای از اسف بار بودن واکسیناسیون در ایران است.....»

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.