خودآموزی

سؤالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

مقاله بروسلوز

۱ـ انتقال بیماری بروسلوز عمدتاً به چه طریقی صورت می‌گیرد؟

الف ـ انسان آلوده با انسان
ب ـ حیوان آلوده به انسان
ج ـ انسان آلوده به حیوان
د ـ حیوان آلوده به حیوان

۲ـ در صورت موفقیت درمان، تیتر کدام آنتی‌بادی کاهش می‌یابد؟

الف ـ IgA, IgM
ب ـ IgA, IgG
ج ـ IgM, IgG
د ـ IgM

۳ـ کاهش pH معده در پیشگیری از عفونت با کدام نوع بروسلا موثرتر است؟

الف ـ B. canis
ب ـ B. suis
ج ـ B. abortus
د ـ B. melitensis

۴ـ کدام گونه بروسلا شدیدترین نوع بروسلوز را ایجاد می‌کند؟

الف ـ B. canis
ب ـ B. suis
ج ـ B. abortus
د ـ B. melitensis

خودآموزی

۵ـ شکست در کاهش کدام آنتی‌بادی برای تشخیص عود عفونت پروگنوستیک است؟

الف ـ IgM
ب ـ IgG
ج ـ IgA
د ـ IgM, IgA

۶ـ کدام روش تشخیصی جهت اندازه‌گیری پاسخ ایمنی در بروسلوز دقیق‌تر است؟

الف ـ ELISA
ب ـ 2ME
ج ـ RIA
د ـ SAT

۷ـ دوره کمون بیماری تا بروز تظاهرات بالینی آن چه مدت است؟

الف ـ ۳ ـ ۱ ماه
ب ـ ۴ ـ ۱ هفته
ج ـ ۴ ـ ۲ ماه
د ـ بیش از ۱ ماه

۸ـ درگیری کدام مفاصل در بروسلوز شایع‌تر است؟

الف ـ مفاصل کوچک
ب ـ مفاصل بزرگ hip، زانو و قوزک
ج ـ مفاصل کوچک و بزرگ
د ـ مفاصل مچ دست

۹ـ شایع‌ترین عارضه سیستم عصبی بروسلوز بالغین و درمان آن چیست؟

الف ـ مننژیت، کوتریموکسازول ۲/۵kg/mg تری‌متوپریم ۴ بار در روز
ب ـ اندوکاردیت داکسی‌سیکلین ۱۰۰mg/MID + ریفامپین ۹۰۰mg/d ـ ۶۰۰ به مدت ۲ ماه
ج ـ مننژیت داکسی‌سیکلین ۱۰۰mg/BID + ریفامپین ۹۰۰mg/d ـ ۶۰۰ به مدت ۲ ماه
د ـ مننژیت داکسی‌سیکلین ۱۰۰mg/BID + ریفامپین ۹۰۰mg/d ـ ۶۰۰ به مدت ۶ ماه

۱۰ـ چه زمانی بیماری مزمن تلقی می‌شود؟

الف ـ تداوم عفونت بیش از ۶ ماه
ب ـ تداوم عفونت بیش از ۱۲ ماه
ج ـ تداوم عفونت بیش از ۶ هفته
د ـ تداوم عفونت بیش از ۱۲ هفته

۱۱ـ درگیری قلبی در کدام دریچه بیشتر اتفاق می‌افتد؟

الف ـ آئورت
ب ـ میترال
ج ـ پولمونر
د ـ تری‌کوسپید

خودآموزی

۱۲ـ درمان بروسلوز در حاملگی چیست؟
الف ـ کوتریموکسازول 2tab/q12h + ریفامپین ۴۰۰mg/d به مدت ۴ هفته
ب ـ ریفامپین ۹۰۰mg/d + داکسی‌سیکلین ۲۰۰mg/d به مدت ۸ ـ ۱۲ هفته
ج ـ ریفامپین ۹۰۰mg/d + سیپروفلوکساسین ۱g/d به مدت ۶ هفته
د ـ ریفامپین ۹۰۰mg/d + کوتریموکسازول 2tab/q12h به مدت ۸ هفته

۱۳ـ در بیماران مبتلا به برسلوز با عوارض اسپوندیلیت، کدام درمان انتخابی است؟
الف ـ داکسی‌سیکلین + ریفامپین به مدت ۳ ماه
ب ـ سیپروفلوکساسین + ریفامپین به مدت ۶ ماه
ج ـ ریفامپین + استرپتومایسین به مدت ۶ ماه
د ـ استرپتومایسین ۱۴ روز + داکسی‌سیکلین و ریفامپین به مدت ۶ ماه

۱۴ـ درمان انتخابی بروسلوز در کودکان کدام رژیم است؟
الف ـ استرپتومایسین ۱gIM/d + داکسی‌سیکلین ۱۰۰mg/BID به مدت ۲ ماه
ب ـ داکسی‌سیکلین ۱۰۰mg/BID + سیپروفلوکساسین ۱g/d به مدت ۱ ماه
ج ـ داکسی‌سیکلین ۲mg/kg/BID + ریفامپین ۱۵mg/kg/d به مدت ۶ ـ ۴ هفته
د ـ کوتریموکسازول ۲/۵mg/kg تری‌متوپریم ۴ بار در روز + داکسی‌سیکلین ۲mg/BID به مدت ۶ ـ ۴ هفته

۱۵ـ در مننژیت بروسلایی، آنالیز CSF چه چیزی را نشان می‌دهد؟
الف ـ کاهش مقدار پروتئین و کاهش گلوکز
ب ـ افزایش پروتئین و افزایش گلوکز
ج ـ کاهش گلوکز و افزایش پروتئین
د ـ کاهش گلوکز و کاهش پروتئین

۱۶ـ احتمال درگیری کدام عضو گوارشی، همیشگی است؟
الف ـ معده
ب ـ کبد
ج ـ روده بزرگ
د ـ روده کوچک

خودآموزی

۱۷ـ در آزمایش خون بیمار مبتلا به بروسلوز چه تغییراتی ایجاد می‌شود؟
الف ـ افزایش WBC و افزایش پلاکت و آنمی
ب ـ کاهش WBC، کاهش پلاکت و آنمی
ج ـ افزایش WBC، کاهش پلاکت و آنمی
د ـ کاهش WBC، افزایش پلاکت و آنمی

۱۸ـ یووئیت بروسلایی چگونه درمان می‌شود؟
الف ـ استروییید موضعی و سیستمیک
ب ـ استروییید سیستمیک به تنهایی کافی است.
ج ـ استروییید موضعی به تنهایی کافی است.
د ـ تجویز آنتی‌بیوتیک ضدبروسلایی، یووئیت را درمان می‌کند.

۱۹ـ کدامیک از جملات زیر در ارتباط با واکسیناسیون بروسلوز صحیح می‌باشد؟
الف ـ واکسن برای تمام سوش‌های بروسلوز در بازار موجود است.
ب ـ واکسن موثر برای ایمونیزاسیون انسان علیه بروسلوز وجود ندارد.
ج ـ واکسن بروسلوز بایستی هر ساله تزریق گردد.
د ـ واکسن بروسلوز می‌تواند از بروز مننژیت معمولی نیز جلوگیری نماید.

۲۰ ـ کدامیک از گزینه‌های زیر در ارتباط با مصرف جنتامایسین به جای استرپتومایسین در درمان بروسلوز مطرح می‌باشد.
الف ـ جنتامایسین ارزان‌تر از استرپتومایسین می‌باشد در نتیجه بایستی جایگزین آن گردد.
ب ـ جنتامایسین دارای جذب بهتری می‌باشد در نتیجه بایستی جایگزین آن گردد.
ج ـ جنتامایسین در in vitro علیه بروسلا فعال‌تر می‌باشد در نتیجه بایستی جایگزین آن گردد.
د ـ مصرف جنتامایسین دوره درمان را کوتاه‌تر می‌نماید در نتیجه بایستی جایگزین آن گردد.

خودآموزی

لطفاً از تغییر اندازه (بزرگ یا کوچک کردن) پاسخ نامه خودداری فرمایید و فتوکپی پاسخ ها را نزد خود نگه دارید.

خودآموزی

پاسخنامه ۱۲

نام و نام خانوادگی ..... استان .....شهرستان ..... شماره نظام پزشکی .....

تعداد پاسخ های صحیح ..... تعداد پاسخ های غلط.....نمره به درصد ..... نمره بازآموزی .....

	(الف)	(ب)	(ج)	(د)		(الف)	(ب)	(ج)	(د)
۱					۱۱				
۲					۱۲				
۳					۱۳				
۴					۱۴				
۵					۱۵				
۶					۱۶				
۷					۱۷				
۸					۱۸				
۹					۱۹				
۱۰					۲۰				

خودآموزی

نظرسنجی مقالات بازآموزی

ارزشیابی مقاله خودآموزی

بروسلوز

شماره ۲، اسفند ۸۳، صفحات ۶ تا ۱۷

	(۱)*	(۲)	(۳)	(۴)	(۵)**
۱ـ محتوای مقاله با اهداف خودآموزی مطابقت داشت.	☐	☐	☐	☐	☐
۲ـ مقاله از ساختار مناسبی برخوردار بود.	☐	☐	☐	☐	☐
۳ـ نیاز علمی مخاطب در مقاله رعایت شده بود.	☐	☐	☐	☐	☐
۴ـ مقاله برای خواننده مفهوم بود.	☐	☐	☐	☐	☐
۵ـ مندرجات مقاله موجب افزایش یا یادآوری اطلاعات خواننده می‌شد.	☐	☐	☐	☐	☐
۶ـ مقاله افق جدیدی برای خواننده در مورد کارهای رایج پزشکی یا داروسازی به‌وجود می‌آورد.	☐	☐	☐	☐	☐
۷ـ سؤالات خودآموزی متناسب با مقاله طراحی شده بودند.	☐	☐	☐	☐	☐

(۱)ـ** قسمت اول به معنای: کاملاً مخالف می‌باشم. *(۵)ـ** ستون پنجم به معنای: کاملاً موافق هستم.

ستون‌های مابین حد وسط اظهار نظر می‌باشند.

پیشنهاد شما در مورد این مقاله چیست ؟

(لطفاً در صورت لزوم به اختصار بنویسید).

.....

.....

.....