

سندروم روده تحریک‌پذیر

دکتر ثریا منتظری

فروکتوز، بیماری سلیاک، عفونت‌های خفیف و عفونت‌های انگلی مانند ژیاردیازیس، انواع بیماری‌های التهابی روده، بیوست مزمن عملکردی و دردهای عملکردی مزمن در ناحیه شکم ممکن است به صورت IBS ظاهر یابند. در این بیماری، آزمایش‌های معمول بالینی هیچ‌گونه اختلالی را نشان نمی‌دهند، هرچند روده‌ها ممکن است حساسیت بیشتری نسبت به برخی حرکت‌های خاص مانند آزمون عبور بالون نشان دهند.

علی‌رغم آن که علت دقیق IBS مشخص نیست، رایج‌ترین تئوری این است که از اختلال در تعامل میان مغز و دستگاه گوارش پدید می‌آید، اگرچه ممکن است نوعی اختلال در فلور روده‌ها یا دستگاه ایمنی بدن نیز در ایجاد آن نقش داشته باشند. IBS در اغلب بیماران منجر به شرایط خطرناک

سندروم روده تحریک‌پذیر (IBS) نوعی اختلال در عملکرد روده است که با درد مزمن در ناحیه شکم، احساس ناراحتی، نفخ و تغییرات در عادات روده‌ای، بدون هرگونه علت عضوی دیگری مشخص می‌شود. اسهال یا بیوست می‌تواند علامت غالب باشد که ممکن است به صورت متناوب ظاهر شوند. نوعی از این بیماری که در آن اسهال علامت غالب باشد، IBS-D می‌خوانند، نوعی که بیوست علامت غالب را تشکیل دهد، IBS-C نامیده می‌شود و به نوعی که این دو علامت متناوباً ظاهر شوند، IBS-A می‌گویند. IBS ممکن است پس از یک عفونت به وجود آید که آن را IBS-PI می‌نامند. یک واقعه استرس‌زا در زندگی یا شروع بلوغ، می‌تواند بدون علم پزشکی دیگری، آغازگر IBS باشد. حالات‌های مختلفی از جمله عدم جذب

مواد، ارزش غذایی بالایی داشتند. از مدت‌ها قبل، سندروم روده تحریک‌پذیر وجود داشته، اما یک مشکل نادر روده نامنظم تلقی می‌شد. در سال ۱۹۵۰ در مقاله‌ای در مجله پزشکی کوههای راکی به مفهوم IBS اشاره شده است. این اصطلاح برای بیمارانی که عالیم گسترده اسهال، درد شکمی و یبوست داشتند ولی عوامل شاخنه شده عفونی در آنان یافت می‌شد، به کار می‌رفت. تئوری‌های اولیه، عوامل استرس‌زا و مشکلات روانی را باعث بروز IBS دانستند.

نمی‌شود اما به خاطر عوارض جانبی از جمله درد مزمن و خستگی، می‌تواند هزینه‌های درمانی بیمار را افزایش داده و باعث افزایش غیبت بیمار از محل کارشان شود. محققان گزارش کرده‌اند که شیوع بالای سندروم روده تحریک‌پذیر، می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های اجتماعی گردد. این بیماری هم چنین یک بیماری مزمن است که می‌تواند کیفیت زندگی بیمار را به طرز چشمگیری تحت تأثیر قرار دهد.

■ تاریخچه

طی سال‌های قبل، IBS مانند امروز شایع نبود، زیرا استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های قوی و داروهای دیگری که مخل رشد طبیعت، سلامت و تعادل باکتری‌های روده هستند، رواج امروزی را نداشت. داروهای پیشخوانی (OCT) که در داروخانه‌ها عرضه می‌شوند، می‌توانند برای یک‌دن، بسیار تهاجمی باشند. دهه‌های قبل، در برداشت میوه‌ها و سبزیجات تازه، از مواد شیمیایی اندکی استفاده می‌شد، در حالی که امروزه تقریباً تمام میوه‌ها و سبزیجات موجود در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، با چندین ماده شیمیایی آغشته شده‌اند و گوشت گاو موجود در قفسه‌ها از کشتزارهایی آمده است که در آن گاوها غذاهای حاوی مواد شیمیایی متعدد مصرف نموده‌اند. رژیم غذایی امروز ما مملو از غذاهایی است که مواد نگهدارنده فراوانی داشته و از ارزش غذایی کمی برخوردار هستند. در گذشته غذاهایی که به طور معمول وارد بازار مواد غذایی می‌شدند، خالی از مواد نگهدارنده بودند که به همین دلیل در اغلب موارد به سرعت فاسد می‌شدند. آن

■ درمان و داروها

به دلیل آن که علت‌های بروز سندروم روده تحریک‌پذیر مشخص نیست، درمان برای رها شدن از عالیم به نحوی که فرد بتواند حتی‌الامکان به صورت طبیعی زندگی کند، متمرکز شده است. در بیشتر موارد فرد می‌تواند به طور موقفيت‌آمیزی عالیم و نشانه‌های خفیف سندروم روده تحریک‌پذیر را با کنترل استرس و ایجاد تعییراتی در رژیم غذایی و سبک زندگی کنترل کند. اجتناب از غذاهایی که عالیم بیماری را تشدید می‌کند، هم‌چنین ورزش به مقدار کافی، مصرف مقادیر لازم از مایعات و خواب کافی اگر مشکل متوسط یا شدید است، بیشتر از تعییر سیک زندگی، با تجویز پزشک نیاز به مصرف دارو می‌باشد.

■ تغییر رژیم غذایی

□ حذف غذاهای مولد گاز زیاد در صورتی که بیمار به دلیل جمع شدن گاز و تورم روده، مقادیر قابل توجهی گاز دفع می‌کند،

□ داروهای آنتی کلی نرژیک و آنتی اسپاسmodیک
این داروها مانند هیوسیامین و دی سیکلومین می‌توانند برای رهایی از اسپاسم‌های دردناک روده مؤثر باشند. این گروه بعضی اوقات برای افرادی که مبتلا به اسهال هستند، استفاده می‌شود ولی بیوست را تشدید کرده و می‌توانند منجر به سایر علایم مانند اشکال در دفع ادرار شوند. همچنین در افراد مبتلا به گلوکوم باید با احتیاط مصرف شوند.

□ داروهای ضدافسردگی

اگر علایم بیمار شامل درد یا افسردگی ادامه باید، پژشک ممکن است یک ترکیب ضدافسردگی سه حلقه‌ای یا یک مهارکننده انتخابی سروتونین (SSRI) پیشنهاد کند. این داروها برای رهایی از افسردگی کمک می‌کنند، به همان نحوی که فعالیت نورون‌های کنترل کننده روده را مهار می‌کنند.

اگر فرد مبتلا به اسهال و دردهای شکمی بدون علایم افسردگی باشد، پژشک ممکن است یک ضدافسردگی سه حلقه‌ای کمتر از مقدار مصرف طبیعی مانند ایمی‌پرامین یا نورتربیتیلین پیشنهاد کند. عوارض جانبی این داروها شامل خواب آلودگی و بیوست می‌باشد. ترکیب‌های SSRI از جمله فلوکستین یا پاروکستین، در صورت ابتلای بیمار به افسردگی و درد و بیوست، می‌توانند مفید باشند.

□ آنتی بیوتیک‌ها

برخی از بیماران که علایم آن‌ها به دلیل رشد زیاد باکتری‌ها در روده شان می‌باشد، درمان آنتی بیوتیکی می‌تواند برایشان مفید باشد.

برای بعضی افراد با علایم اسهال داروی ریفاکسیمین (Rifaximin) مفید بوده ولی

پژشک ممکن است مصرف موادی از جمله نوشیدنی‌های گازدار، سبزیجات به خصوص کلم، بروکلی و گل کلم و میوه‌های خام را قطع کند.

□ حذف گلوتن (پروتئین غلات)
مطالعه‌ها نشان می‌دهند که بعضی از افراد مبتلا به IBS، با توقف در مصرف گلوتن (گندم، جو و چاودار) بهبودی در علایم اسهال را گزارش می‌کنند. این پیشنهاد بحث‌برانگیز است و مدارک روشن نیستند.

□ FODMAPs

بعضی از افراد نسبت به گروهی از کربوهیدرات‌ها از جمله فروکتوز، فروکتان، لاکتوز و سایرین حساسیت دارند که FODMAPs نامیده می‌شوند. این ترکیب‌ها در بعضی غلات، سبزیجات، میوه‌ها و محصول‌های لبنی وجود دارند ولی اغلب مردم از غذاهای حاوی این گروه اذیت نمی‌شوند.

□ مکمل‌های حاوی فیبر

دریافت مکمل‌های دارای فیبر مانند گسیلیوم یا متیل سلولز همراه مایعات می‌تواند به کنترل بیوست کمک کند. فیبر به دست آمده از غذا ممکن است سبب نفخ (گاز) بیشتری در مقایسه با فیبر مکمل‌ها شود. اگر فیبر به کنترل علایم کمک نکند، ممکن است پژشک یک ملین اسموتیک مثل شیرمنیزی یا پلی اتیلن گلیکول تجویز کند.

□ داروهای ضداسهال

داروهای بدون نسخه مانند لوپرامید، می‌تواند به کنترل اسهال کمک کند. برخی افراد می‌توانند از ترکیب‌هایی مانند کلسترامین استفاده کنند ولی این گروه می‌توانند منجر به تجمع گاز در روده شوند.

فروش داده است.

Rifaximin (Xifaxan) – ۲

ریفاکسیمین آنتی‌بیوتیکی است که در ماه مه ۲۰۱۵ برای درمان IBS-D در بزرگسالان توسط FDA تأیید شده است. عملکرد آن کاهش یا تغییر باکتری در روده می‌باشد. به نظر می‌رسد که عالیم IBS از جمله تورم روده به علت جمع شدن گاز و اسهال پس از یک دوره ۱۴-۱۰ روزه درمان بهبودی یابد. این دارو فقط مقدار کمی در روده جذب شده و معمولاً به خوبی تحمل می‌شود. اگرچه برخی از بیماران پس از مصرف یک دوره ریفاکسیمین از عالیم IBS رها می‌شوند، بعضی دیگر نیازمند درمان تا ۲ دوره با همان مقدار مصرف هستند. اطلاعات بیشتری در مورد طول مدت رهایی از عالیم و بهترین راه درمان برای جلوگیری از عود عالیم، مورد نیاز است.

Eluxadoline (Viberzi) – ۳

داروی جدیدی است که روی گیرندهای سیستم عصبی اثر می‌کند و سبب کاهش انقباض‌های روده می‌شود. این دارو برای IBS-D در مردان و زنان بزرگسال تجویز می‌شود. هم‌چنین دردهای شکمی را کاهش داده و غلظت (قوام) مدفعه را اصلاح می‌کند. دارو در مه ۲۰۱۵ توسط FDA تأیید شده است.

ب - IBS-C همراه با یبوست (Bisacodyl)

Lubiprostone (Amitiza) – ۱

این دارو باعث افزایش ترشح کلرور در روده می‌شود که در نتیجه، حرکات دودی معده را زیاد می‌کند. لوبی پروستون یک داروی نسخه‌ای برای زنان مبتلا به IBS با یبوست شدید و در مردان و زنان مبتلا به یبوست مزمن (بدون دردهای

تحقیق‌های بیشتری مورد نیاز است.

□ مشاوره

در صورتی که افسردگی یا استرس سبب تشدید عالیم بیماری شده است، مشاوره می‌تواند مفید باشد.

■ داروهای جدید در درمان IBS

داروهای جدیدی تولید شده‌اند که به نظر می‌رسند در درمان عالیم مختلفی از سندروم IBS مؤثر باشند. این داروها نسخه‌ای هستند که باید تحت نظر پزشک تحویز و مصرف گرددن. بیمار باید دارو را مطابق دستور استفاده کند و تمام داروهای دیگر مورد مصرف خود را اعم از نسخه‌ای و یا بدون نسخه، به پزشک توضیح دهد.

الف - IBS-D همراه با اسهال (Lotronex – ۱)

آلومترنون برای شل کردن کولون و کاهش حرکات دوده روده باریک طراحی شده است. مکانیسم اثر آن انسداد سیگنال‌های سروتونین که اطلاعات حساس را از روده به مغز انتقال می‌دهد (دردناک و غیردردناک) و کاهش اسهال و دردهای شکمی می‌باشد.

آلومترنون در زنان مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر همراه با اسهال (IBS-D) که دچار اسهال شدید هستند و به سایر درمان‌ها جواب نداده‌اند، مجوز مصرف دارد. این دارو به دلیل عوارض جانبی جدی نادر ولی احتمالی، تحت برنامه درمانی با مراقبت دقیق تجویز می‌شود. آلومترنون برای استفاده در مردان مجاز نیست. یک بار آن را از بازار دارویی جمع‌آوری نموده، ولی دوباره به آن اجازه

■ داروهای مورد مطالعه

تحقیق‌هایی برای دست‌یابی به داروهای جدید در درمان افراد مبتلا به IBS در حال انجام است. پروبیوتیک‌ها میکرو ارگانیسم‌های مفید برای سلامتی انسان هستند که معمولاً باکتری‌های زنده می‌باشند. برخی مدارک نقش آن‌ها را در IBS برای فرمولاسیون‌هایی، به خصوص در مکمل‌های پروبیوتیک، به طور عمده در عالیم تجمع گاز و تورم روده نشان می‌دهند. داروهای جدید نسخه‌ای نیز در حال مطالعه هستند که هنوز توسط تأیید نشده‌اند.

شکمی) می‌باشد.

۲ – Linaclootide (Linzess)

لیناکلوتاید جزو گروهی از داروها است که آگونیست‌های گوانیلات سیکلаз - C نامیده می‌شوند. این دارو با افزایش جایه‌جایی محتويات لوله گوارش و توقف سیگنال‌های درد در روده‌ها، عمل می‌کند. دارو برای افراد بالای ۱۸ سال در IBS-C و برای بیوست مزمن (CC) تجویز می‌شود. در مطالعه‌های به عمل آمده، بیماران مصرف کننده لیناکلوتاید، عوارضی از جمله درد و جمع شدن گاز در روده را گزارش کرده‌اند. این دارو در کانادا و اروپا با نام Constella وجود دارد.

منابع

1. Chey WD, Kurlander J, Eswaran S. Irritable bowel syndrome: a clinical review. *J Am Med Assoc* 2015; 313(9): 949 - 958.
2. Ducrotte R. Irritable bowel syndrome: Current treatment options. *Presse Med* 2015; 44: 1619 - 1625.

