

# بررسی چگونگی مصرف دارو در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲ توسط فرهنگستان علوم پزشکی ایران

«قسمت سوم»

## مقدمه

گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی طرحی پژوهشی پیرامون چگونگی مصرف دارو در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲ را تهیه و تدوین نموده است. مجریان این طرح پژوهشی که می‌توان آن را «تجویز و مصرف منطقی دارو» نیز نامید، آقایان دکتر مرتضی نیلفروشان و دکتر احمد شیبانی از اعضای گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی ایران می‌باشند. همکاران اصلی طرح آقای دکتر خسرو بیاتی، خانم دکتر عاطفه واعظی و دکتر حسام شریف‌نیا هستند. دیگر همکاران این طرح پژوهشی عبارتند از:


دکتر لیلا کوتی، دکتر آرزو مبهوت، دکتر یاسمن علویان، دکتر کاوه کاظمیان، دکتر امید تولابی، دکتر فاطمه شه‌ریاری، آقای علی رضانزادنیک و خانم مریم جاذب.


مشاور و ناظر این طرح خوب و راهگشا که می‌تواند نقشه راه آینده مصرف منطقی دارو در ایران باشد، استاد بزرگوار و فخر نظام دارویی و داروسازی ایران مرحوم دکتر عباس شفیعی می‌باشد. ضمن تشکر از گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی ایران که این طرح را در اختیار نشریه رازی قرار داده‌اند، و آرزوی علو درجات برای مرحوم دکتر عباس شفیعی، این طرح را به تدریج و در قسمت‌های مختلف در رازی چاپ می‌کنیم. لازم به یادآوری است که این طرح در بهمن سال ۱۳۹۴ خاتمه یافته است.

میلیون عدد در سال ۱۳۹۲ (۷۰ عدد به ازای هر نفر) رسیده است. این گروه نیز به ۸ دسته (به علاوه گروه داروهای سرماخوردگی) تقسیم شدند:


### ۳- مسکن‌ها (۷۲ دارو)

تعداد کل اقلام دارویی در این دسته ۷۲ دارو بوده و مصرف داروهای مسکن از ۳،۲۳۰ میلیون عدد در سال ۱۳۷۹ (۵۰ عدد به ازای هر نفر) به ۵،۴۵۳






نمودار ۲ - محصولات حاوی کدیین‌ها




نمودار ۳ - بروفن‌ها


بررسی چگونگی مصرف دارو در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲ «قسمت سوم»




نمودار ۴ - آسپیرین‌ها



نمودار ۵ - سلکو کسیب




نمودار ۶ - ناپروکسن




نمودار ۷ - مگنمیک اسید

بررسی چگونگی مصرف دارو در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ «قسمت سوم»



نمودار ۸ - دیگر مسکن‌ها



نمودار ۹ - سرماخوردگی‌ها