



## خاطرات دارو خانه

و سنگینی در منطقه اپی گاستر (حدود ۴۵ تا ۶۰ دقیقه بعد از صرف غذا و همچنین با درد شبانه که با خوردن غذا، مواد ضد اسید و یا استفراغ تسکین پیدامیکند شناخته میشود. مرد ۳۵ ساله‌ای با عوارض فوق به پزشك متخصص گوارش مراجعه و بعد از معاينات کامل و قطعی شدن زخم اثنی عشر، بانسخهای شامل سوسپانسیون آلومینیوم آم جی اس با دوز ۱۰ تا ۲۵ میلی لیتر نیم تا یک ساعت بعد از هر وعده غذا، کلیدینیوم سی با دوز هر وعده یک قرص پیش از غذا و درنهایت قرص سایمتیدین با دوز یک قرص قبل از هر وعده غذا و دو قرص قبل از خواب به دارو خانه مراجعه میکند. بدلیل شلوغی دارو خانه، بدخطی پزشك معالج و نزد یکی قرص سایمتیکون به قرص سایمتیدین در قفسه داروهای گوارشی، "اشتهاها" بجای سایمتیدین، سایمتیکون به بیمار داده میشود و با خطی بسیار ناخوانا، علامت روزی سه قرص روی بسته دارو نوشته میشود. بیمار داروها را دریافت و به مدت بیست روز بجای سایمتیدین سایمتیکون مصرف میکند. در مراجعت بعدی به پزشك

آیا فکر کرده‌اید که یک اشتباه کوچک در دارو خانه ممکن است جان بیماری را به خطر اندازد، و یا براستی در ماه چند بار خطر میکنید. برای پاسخگویی به بیمار آسیب دیده و یا هراسان از اشتباه شما، توضیح توأم با شرمندگی را کافی میدانید و بعد از کسب رضایت از بیمار حقیقتاً "احساس آرامش" می‌کنید، و یا اینکه خاطره تلخ حادث شده را برای همیشه نصب العین داشته و از هر نظر زمینه را برای جلوگیری از تکرار اشتباه آماده میسازید. اگر واقعاً "دل شما از حوادث و خطرات ایجاد شده توسط خود و دوستانتان بدرد آمده، خاطرات خود را بطور خلاصه مرقوم فرمائید تا با درج آن در این صفحه از تکرارش در جای دیگر جلوگیری گردد.

### سایمتیدین – سایمتیکون

زخم اثنی عشر علیرغم کاهش همه ساله به نسبت ۸٪، باز هم یکی از ابتلاهای بزرگ است و سن متوسط بروز آن بین ۳۵ - ۴۵ سالگی است. این بیماری در موارد علائم کلاسیک، با نشانه پیدایش درد یا ناراحتی

زخم معده، ازو فاژیت پیتیک، سندروم زولینگر-لیسون و زخم های ناشی از استرس، داروی موثری است. در سندروم زولینگر-لیسون که نشانه های آن عبارت از:

- ۱- وجود بیماری شدید زخم پیتیک
- ۲- افزایش شدید ترشحات معده
- ۳- افزایش میزان گاسترین سرم است و با وجود گاسترینوم در لوز المعده و اثنی عشر شناسائی می شود داروی انتخابی است، بطوریکه با پیدایش سایمتيدين بسیاری از بیماران بهبود یافته اند.

سایمتيكون که همان ديمتيكون فعال شده است بعنوان ضد نفخ برای تسکین ناراحتی های حاصل از تجمع گاز در مجاری گوارشی به تنها یا به همراه آنتی اسیدها داده می شود. با کمی دقت در داروخانه میباشد این مطلب مشخص می شد که وقتی پرشک معالج آلومینیوم ام جی اس تجویز می کند که در ترکیب آن سایمتيكون وجود دارد دیگر ضرورتی برای تکرار سایمتيكون نیست. ثانیا "دوز دارو کاملا" مشخص می کند که سایمتيدين داروی نسخه است. در ضمن اگردادن اطلاعات

معالج دوباره داروها تکرار میگردد و بیمار بار دوم با ملاحظه جعبه سایمتيدين نسبت به داروی دریافتی اعتراض میکند. مسئول داروخانه با دقت نسخه را مجددا" بررسی

ه سایمتيكون که همان ديمتيكون  
فعال شده است بعنوان ضد نفخ  
برای تسکین ناراحتی های حاصل  
از تجمع گاز در مجاری گوارشی  
به تنها یا به همراه آنتی  
اسیدها داده می شود.

و پاسخ میدهد که علتی برای اشتباه نمی بیند. بهر حال بیمار متوجه میگردد که در مرحله اول دارو اشتباه داده شده و لذا با حالت اضطراب شدید، که خود باعث تشديد بیماری است به داروخانه اول مراجعه و بشدت معرض تحويل داروی اشتباه میگردد، غافل از اینکه درمان بنوبه خود عقب افتاده و عصبانیت و دلهره بیشتر چاره ساز نیست.



داروئی در موقع نسخه پیچی یک وظیفه باشد که هست و اصولاً مسئولیت داروساز رساند. دستورات و اطلاعات دارویی است، در چنین موقعی حتماً می بایستی سئوالاتی در مورد سن، جنس، نوع بیماری بعمل آید

**بحث و نتیجه**  
سایمتيدين یک آنتاگونیست گیرنده های  $H_2$  هیستامین است. این دارو عمل هیستامین را بر روی گیرنده های  $H_2$  سلولی متوقف کرده و مانع از تحریک ترشح اسید بوسیله غذا، گاسترین، هیستامین یا کافئین می شود. عوارض جانبی آن بصورت ناتوانی جنسی، بزرگ شدن پستانها و ترشح شیر، افزایش کراتینین سرم، کاهش مقدار IgG و IgM، بثورات جلدی، خونریزی گوارشی و لکوپنی ظاهر میگردد. علاوه بر زخم اثنی عشر، در

و دانستن زخم اثنی عشر کافیست که ما را برای تحويل داروئی صحیح و دستورات درست داروئی راهنمائی کند.

## ه بروچسب‌های همنگ گاهی باعث اشتباه در داروخانه می‌گردد، خصوصاً اگر بروچسب همنگ یک داروی خوراکی در داروی استعمال خارجی بکاررفته باشد.

**اکالیپتوس اینهالر**—شربت سرفه کودکان  
بر چسب‌های همنگ گاهی باعث اشتباه در داروخانه می‌گردد، خصوصاً اگر بروچسب همنگ یک داروی خوراکی در داروی استعمال خارجی بکار رفته باشد. از جمله چنین داروهایی بر چسب اکالیپتوس ساخت شرکت پاک دارو با شربت سرفه و سرماخوردگی کودکان همین کارخانه است که در داروخانه باعث اشتباه می‌گردد. البته ناگفته نماند که این مساعله در موقعی است که عدم دقت وجود دارد و شلوغی داروخانه نیز مزید علت می‌شود.

پدری برای دریافت داروهای فرزند دو ساله خود که بشدت سرماخوردگی و سرفه می‌کند به داروخانه مراجعه و در داروخانه اشتباه "بجای شربت سرفه کودکان بخور اکالیپتوس شرکت پاک دارو تحويل و دستور داروئی روزی سه قاشق مرباخوری میل شود روی شیشه دارو درج می‌شود. بدلیل سرفه شدید و بی در بی بجه، مادر بیمار در نوبت اول بجای یک قاشق مرباخوری شربت سرفه کودکان،

متاسفانه دو قاشق بخور اکالیپتوس به طفل بیمار میخوراند. بعد از مدتی بیمار دچار دل درد شدید، تهوع و استفراغ شده و با حالت رنگ پریده به کلینیک رسانده میشود.

اول پزشک معالج تصور میکند که بعلت دوز بالای شربت سرفه بیمار مبتلا به دل درد و تهوع شده و حالت خواب آلودگی و ضعف عضلات و رنگ پریدگی بدلیل ترکیبات انتی‌هیستامین و الكل اتیلیک موجود در شربت سینه است، لذا با درمان علامتی بهبودی نسبی حاصل می‌گردد و بیمار به منزل مراجعت داده شده و پزشک معالج

بجای شربت سرفه کودکان قطره کلوبوتینول تجویز میکند. در منزل همسایه‌ها از موضوع باخبر شده و جهت پرسش حال مریض مراجعه و دختر خانم همسایه با ملاحظه بر چسب بخور و اینکه بجای شربت سرفه کودکان بخور اکالیپتوس به بیمار داده شده مراتب را باطلاع پدر و مادر کم سواد بیمار میرساند. موضوع به داروخانه کشیده شده و پدر عصانی بدلیل درد و رنج فرزند خود، با تحدید اینکه فرزندم فوت کرده در داروخانه جنجالی بیا میکند و بالاخره با پا درمیانی پزشک معالج به طرفداری از داروخانه که حالا موضوع را فهمیده، مشکل در شرایطی خاتمه‌پیدا میکند که خانواده بیمار هرگز این خاطره تلخ را فراموش نخواهد کرد.

### بحث و نتیجه

بخور اکالیپتوس ترکیبی است از: تتطور اکالیپتوس یک گرم در ۵ میلی‌لیتر، تتطور بنزووان یک گرم در ۵ میلی‌لیتر، منتول ۵۰ میلی‌گرم در ۵ میلی‌لیتر و الكل ۳ گرم در ۵ میلی‌لیتر. این ترکیب بصورت بخور

این دارو با دوز نصف قاشق مرباخوری ۳ تا چهار بار در روز برای تسکین موقتی سرفه ناشی از سرماخوردگی و تسکین احتقان بینی و یا تظاهرات آلرژیکی قسمت فوقانی دستگاه



تنفس در کودکان داده میشود، و عوارض جانبی این دارو عبارت از: اضطراب، بیقراری، تعریق، بیخوابی، لرزش، ضعف، سردرد، سرگیجه، تهوع و استفراغ است. برای پرهیز از چنین مشکلاتی بایستی بر چسب داروهای خوراکی مشخص و محل چیدن آنها در داروخانه کاملًا از داروهای خوراکی مجرزا باشد.

### گلوكانتيم - گلوكونات کلسیم

گلوكانتيم نام تجاری مگلومین آنتی موئیت است که بعنوان داروی انتخابی برای درمان لیشمانيوز جلدی (سالک) و لیشمانيوز احشاءی (کالا آزار) مورد مصرف دارد. لیشمانيوز اصطلاحاً "نام کلی گروهی از بیماریهای است که توسط انگل تک یاخته‌ای نسجی و خونی پرتوزوئر بنام کلی لیشمانيا بوجود می‌آید. این پرتوزوئرها در سلولهای ماکروفاز در سلولهای ماکروفاز انسانی و جانوران خونگرم زندگی کرده و تکثیر پیدا میکند. برای انتقال آنها عموماً لازم است ناقلی بنام پشه خاکی وجود داشته باشد.

چند بار در روز جهت تسکین علائم سرماخوردگی بکار میرود. معمولاً هر بار ۵ میلی لیتر از محلول را در یک طرف آب در حال جوش ریخته و چند دقیقه بخور میدهند. ترکیبات داروی فوق الذکر اگر بصورت خوراکی داده شود باعث مسمومیت میگردد. مرگهای با ۳/۵ میلی لیتر اکالیپتوس دیده شده است. علامت مسمومیت عبارت است از سوزش، ابی گاستر بهمراه تهوع و معمولاً "استفراغ، سرگیجه، آتاکسی، ضعف عضلات، بهت، رنگ پریدگی و گاهی سبانوز، تنفس صدادار (صدای خرخربعت ادم)، میوزیس، هذیان و گاهی تشنج نیز اتفاق می‌افتد. برای درمان مسمومیت معمولاً از شستشوی معده با آب یا محلول بیکربنات سدیم استفاده میکنند. از مسهل نمکی، سفیده تخم مرغ، مایعات زیاد، تجویز محركها و درمان با اکسیژن بر حسب ضرورت کمک گرفته میشود. انشاء الله با دقت و حساسیت به انجام مسئولیت در داروخانه چنین اشتباہی پیش نیاید، و توصیه میگردد در صورت بروز مشکل حتماً "برای

ه برای درمان مسمومیت ناشی از خوردن اکالیپتوس اینهالر معمولاً از شستشوی معده با آب یا محلول بیکربنات سدیم استفاده می‌کنند.

درمان از متخصص امر کمک گرفته شود. شربت سرفه کودکان ترکیبی است از دکسترومتروفان، کلرفنیرامین مالئات، فنیل پروپانولامین، فنیل افرین و گایافنزین.

اشتباه کلسمیم با مگلومین آنتی موئیت به ندرت ممکن است اتفاق بیفتد و توقع این بود که، حداقل بخش تزریقات متوجه اشتباه داروخانه میشد، ولی گویا در دسترس نبودن نسخه و درخواست بیمار باعث گردیده که کنترل مرحله تزریقات نیز عملی نگردد.

آمپول کلسمیم از جمله داروهایی است که در هیپوکلسمی بصورت وریدی تجویز میگردد، البته در صورت امکان استفاده از راه خوراکی، تزریق آن ضرورتی پیدانمی کند. هیپوکلسمی در موارد زیر دیده میشود:

کمی واردات یا جذب: سندروم بدی جذب،  
کوتاه کردن روده کوچک، کمبود ویتامین D  
(راشی تیسم، استئومالاسی)

افزايش صادرات: نارسائی مزمون کلیه،  
تجویز دیورتیکها

اختلالات هورمونی: کم کاری پاراتیروئید بصورت اصلی و کاذب، ترشح کلسمی توئین هماه با کارسینوم تیروئید.

علائم هیپوکلسمی بصورت چنگ شدن عضلات، تتانی، تشنج، خرسک و تنگی نفس، پیچش‌های شکمی و تکرار ادرار ظاهر میشود. خود درمانی با این دارو به هیچوجه توصیه نمیگردد و تزریق کلسمیم بعنوان آمپول گرم کننده متساقنه یک عوام فربی شایع است که غیر از صرف هزینه و عوارض جانبی ناشی از خطرات تزریق، کمکی به بیمار نمیکند. باید ادعان کرد که با توجه به اندیکاسیون محدود کلسمیم تزریقی، مصرف سالی پنج میلیون آمپول کلسمیم گلوکنات به مفهوم واقعی، مصرف سی رویه چنین دارویی رانشان میدهد.

بیمار ۲۵ ساله‌ای برای درمان چند رخمناشی از گوش حشره که زخمها کاملاً نکروزه و با در هم شکستن ایتیلیوم بصورت یک برآمدگی که وسط آن فرو رفته و شبیه دهانه آتشفشار شده است به پزشک متخصص پوست مراجعه میکند. تشخیص سالک با آزمایش قطعی میگردد، لذا برای درمان طبق دستور پزشک، بیمار آنتی موان پنج طرفیتی بصورت تزریق عضلانی با دوز یک سانتی متر مکعب بازاء هر ۳ کیلوگرم وزن بدن در ۲۴ ساعت بمدت چهار روز دریافت میکند. فاصله دو دوره درمان چهار هفته است و وقتی بعد از چهار هفتگه بیمار به پزشک معالج مراجعه میکند متوجه میگردد که نسخه پیچ داروخانه بجا آمپول گلوکانتیم (مگلومین آنتی موئیت) آمپول گلوکونات کلسمیم تحويل داده و بیمار طی چهار روز تعداد چهار عدد آمپول کلسمیم از راه ورید دریافت کرده است. بیمار مذکور میگردد که در روزهای تزریق کلسمیم دچار ضعف عضلانی و عطش شدید شده و ناچاراً مرتب مایعات زیاد می‌نوشیده است.

در هر حال بیمار از درمانش بازی ماند و ضمن پرداخت هزینه زیاد، سلامتیش بخطر می‌افتد و اعتراض شدید به مسئول داروخانه و طرح شکایت هم مشکلی را حل نمی‌نماید.

### نتیجه و بحث

مگلومین آنتی موئیت یک داروی آنتی لیشمانيوز است که بصورت آمپول ۱/۵ گرم در ۵ میلی لیتر در لیست داروی ایران آمده است. این دارو روزانه  $100\text{ Mg/kg} - 150\text{ Mg/kg}$  از راه عضلانی با دوره درمان ۱۵ تا ۱۲ تا ۶ تا ۴ تا ۲ هفته مورد مصرف قرار میگیرد. بعد از ۴ تا ۶ هفته استراحت میتوان دوره درمان را تکرار کرد.