



گفت و شنود در داروخانه

مقدمه:

همکاران محترم داروساز هر روزه باستوا اتنی از سوی بیماران و مراجعه کنندگان به داروخانه روپرور می‌باشند. بیمار می‌خواهد که اطلاعاتی درمورد بیماری خود بدست آورده، از کم و کیف درمان آگاه شود و عوامل تأثیرگذار بر روند بیماری یا درمان خود را شناسایی نماید. در چنین مواردی دکتر داروساز بعنوان «سنگ صبور»، با حوصله و دل سپردن به درد دل بیمار مشکل او را درک، و اطلاعاتی به زبان ساده در اختیار او قرار می‌دهد. «گفت و شنود در داروخانه» مطالبی را در چارچوب گفته شده تئیه و خدمت همکاران تقدیم می‌دارد.

چند بار به آن مبتلا شود، گرچه این امر به محیط نگهداری (از نظر تماس با دیگران) و وضع تقدیم کودک بستگی دارد.

چه عوامل باعث قرمزی گلو می‌شوند؟ مهمترین عامل ایجاد کننده قرمزی گلو ویروسها هستند. بیش از ۱۵ نوع ویروس در اینجا میتوانند دخالت داشته باشند. در درجه بعد

قرمزی^۱ گلو چیست؟ قرمزی گلو وجود لکه‌های قرمز یا سفید توأم با التهاب، درد و سوزش در لوزهای گلو می‌باشد. سوزش و درد گلو از شایع‌ترین علائم بیماری‌های بخش فوقانی دستگاه تنفس است که در تمام سال بخصوص در فصل پائیز و شروع مدارس و در بچه‌ها شیوع بیشتری دارد. بطوریکه هر بچه^۲ زیر ۳ سال ممکن است در سال

-۱ Sore throat: به معنای ناسور شدن، قرمز شدن یا دردناک شدن گلودرنظر گرفته شده است.

* مراکز اطلاعات دارونی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چندانی در کاهش موارد و شدت ابتلاء به قرمزی گلو ندارند. در صورت ابتلاء به قرمزی گلو بدون تجویز پزشک هرگز آن‌تی‌بیوتیکها استفاده نکنید. استراحت کردن بسیار مهم است.

برای کاهش درد از یک مسکن (استامینوفن)، برای کاهش سرفه از یک شربت ضد سرفه و جهت رفع انسداد بینی از قطره‌های ضد احتقان در بچه‌ها از سرم فیزیولوژی (نرمال سالین) استفاده کنید. در صورت گرفتگی صدا کمتر حرف زدن بهترین درمان است. از دهان شویه‌ها و قرصهای مکیدنی حاوی مواد ضد عفونی کننده می‌توانید استفاده کنید. اسپری‌ها و دهان شویه‌های حاوی مواد بی‌حس کننده موضعی در موارد حاد بیماری موثر می‌باشد.

۰ چه موقع به پزشک مراجعه کنم؟
اگر قرمزی گلو بیش از یک هفته ادامه یابد – ۵ در صورت عدم مجدد قرمزی گلو ۰ در مواردی که گرفتگی صدا بیش از ۳۲ هفته طول کشیده باشد – ۵ اگر اشکال در بلع دارید – ۵ اگر درمان قبلی ناموفق بوده است.

۰ قرمزی گلو بخصوص در فارنژیت دیده می‌شود که بیشتر موارد ابتلاء به آن در ۴ تا ۷ سالگی است.

۰ در مراجعه به پزشک چه اطلاعاتی به درمان کاملتر و بهتر کمک می‌کند؟
اطلاعات زیر در تشخیص و نحوه درمان برای پزشک بسیار مفید می‌باشد:

با کتریهای مختلف می‌توانند باعث قرمزی گلو گردند. پاره‌ائی از باکتریها بدنبال قرمزی گلو و در صورت عدم درمان صحیح و بموقع باعث عفونتهای چرکی در سینوسها، گوشها، غدد

۰ مهمترین عامل ایجاد کننده قرمزی گلو ویروسها هستند که بیش از ۱۵ نوع ویروس در اینجا می‌توانند دخالت داشته باشند.

لنسفاوی و ریشه‌ها می‌شوند. تشخیص افتراقی قرمزی گلو ناشی از این دو دسته عوامل اغلب مشکل و غیر ممکن می‌باشد. قرمزی گلو ناشی از عوامل فوق اغلب خود بخود بهبود یافته و نیاز به استفاده از داروهای ضد عفونت نمی‌باشد.


چه عالمی همراه با قرمزی گلو دیده می‌شود؟
قرمزی گلو بیشتر همراه با سایر علائم سرماخوردگی دیده می‌شود. این علائم عبارت از: تسب، گرفتگی بینی یا آبریزش از بینی، سردرد، عطسه، سرفه، درد عمومی و غیره می‌باشد. گرفتگی بینی به دلیل تنفس از راه دهان و خشکی مخاط و حلق نهایتاً باعث سوزش گلو می‌گردد.

از چه دارویی قبل از مراجعه به پزشک می‌توانم استفاده کنم؟

راه قطعی برای پیشگیری از ابتلاء به قرمزی گلو وجود ندارد. در این مورد واکسنی موجود نمی‌باشد و برخلاف نظریه رایج، ویتامین ث و داروهای افزایش دهنده مقاومت بدن نیز تأثیر

مدت ادامه یابد درمان داروئی الزامی است. در صورتیکه قرمزی گلو توأم با درد و سایر علائم سرماخوردگی شدید بوده و در مدت ۴۸ ساعت بهبود نیابد حتماً بایستی درمان اساسی انجام پذیرد. ابتلاء مکرر به قرمزی گلو می‌تواند نشان

سن - ۵ مدت ابتلاء به قرمزی گلو - ۵
شدت بیماری - ۵ علائم همراه با قرمزی گلو
بخصوص اشکال در بلع و گرفتگی صدا - ۵
سابقه ابتلاء قبلی - ۵ استعمال دخانیات - ۵
داروهای مصرف شده.



دهنده ابتلاء به بیماریهای حادتر باشد. استعمال دخانیات عامل و خیمتر شدن قرمزی گلو است. اشکال در بلع بعلت ایجاد آبسه در لوزهها است و در صورت پیشرفت، فرد دچار تورم لوزهها خواهد شد که عمل جراحی برای خارج کرده

سن بیمار بر نوع تشخیص تأثیر دارد. بطور مثال ابتلاء به عفونتهای باکتریائی (استرپتوکوکی) در بچه‌های دبستانی بسیار شایع است. اغلب موارد قرمزی گلو طی ۱۰ تا ۱۷ روز خود بخود بهبود می‌یابند. اگر بیش از این

آب سه را ضروری می‌سازد.

می‌شود. نبایستی فراموش کرد که در عفونتهای
کاندیدایائی «Thrush» نیز پلاکهای سفید
رنگ در دهان و گلو دیده می‌شود. هر چند این
پلاکها بندرت محدود به گلو شده و بطور شایع

سخنی با همکاران دارو ساز:

قرمزی گلو یا Sore Throat از

۰ گرچه ظاهر گلودر تشخیص عفونتهای ویروسی از باکتریائی کمک چندانی نمی‌کند
ولی قرمزی گلوی حاد همراه با تب و فقدان علائم عفونت ویروسی دلیل بر ابتلاء به عفونت
باکتریائی بخصوص در سینین نوجوانی می‌باشد.

در نوزادان یا افراد مسن دیده می‌شود. این حالت
می‌تواند عفونتی غیر معمول در بچه‌ها بوده و
علامتی از بیماریهای حاد داخل کننده با سیستم
ایمنی مانند لوسومی، AIDS و یا در اثر درمان با
تضعیف کننده‌های سیستم ایمنی مانند استروئیدها
باشد.

تب گرانولار یکی از انواع عفونتهای
ویروسی گلو می‌باشد. که معمولاً در بچه‌های
کم سن و سال و در سنین ۱۳ تا ۱۹ سال دیده
می‌شود. علاوه بر سایر علائم قرمزی گلو،
گره‌های لنفاوی در گردن و زیر بغل ممکن

شایع ترین علائم بیماریهای بخش فوقانی دستگاه
تنفسی می‌باشد. مهمترین عامل آن ویروسها و
بخصوص رینوویروسها هستند. عوامل میکروبی
مانند استرپتوکوکوس گروه A، کورینه
باکتریوم دیفتری، مایکوپلاسماء، نایسریا
گونوره، نایسر یا منتریتیدس، هووفیلوس

انفلونزا، استرپتوکوکها و استافیلوکوک طلائی
نیز می‌توانند سبب قرمزی گلو شوند. سه دستهٔ
اخیر الذکر معمولاً عوارض چرکی در سینوسها،
گوش، ماستوئید، غدد لنفاوی و ریه‌ها را باعث
می‌شوند. قرمزی گلو بخصوص در فارنزیت
دیده می‌شود که بیشترین موارد ابتلاء به آن در

۴ تا ۷ سالگی است. در فارنزیت ویروسی قب،

بی‌قراری، بی‌اشتهائی و درد گلو وجود دارد. در
فارنزیت استرپتوکوکی درد شکم، سردرد و
استفراغ نیز دیده می‌شود لوزه‌ها متورم و
ملتهب و ترشحات چرکی در این نوع مشهودتر
است. درمان فرم باکتریال فارنزیت بدليل
خطرات و عوارض احتمالی بعدی (تب
روماتیسمی و گلومرولونفربیت) بسیار مهم
می‌باشد. در این مورد پنی سیلین ترجیح داده

۰ گرفتگی و خشن شدن صدابمدت طولانی
دلیل عفونت خفیف گلونبوده و می‌تواند
علامتی برای بیماری‌های حاد مانند سرطان
حنجره باشد.

است متورم و حساس شوند. آنتی‌بیوتیکها ارزش
چندانی در این مورد ندارند و درمان بیشتر
علامتی است.
دهان شویه‌های مورد استفاده در قرمزی

نیاز برای عمل جراحی لوزه‌ها «Tonsillectomy» به متخصص مربوطه ارجاع داده می‌شود.

۲- دختر ۱۴ ساله دچار قرمزی گلوی خفیفی است که از روز قبل شروع شده است. وی شب گذشته کمی تب داشته هم چنین دچار احتقان بینی و احساس درد عمومی است. بمنظور می‌رسد وی مبتلا به عفونت خفیف بخش فوقانی دستگاه تنفسی باشد. علائم ذکر شده طی چند روز آینده بایستی تخفیف یابند. لذا استفاده از محلول دهان شویه و یا نرم‌مال سالین برای غرغره کردن، مصرف قطرهٔ فنیل افرین و استامینوفن را می‌توان پیشنهاد کرد. قرصهای سرماخورد گی حاوی مواد دکوتزستان نیز مفید می‌باشند. با علائم گفته شده از نظر پزشک نیز وی مبتلا به عفونت ویروسی بخش فوقانی دستگاه تنفسی بوده و درمان بالا تأثید می‌گردد.

۳- خانمی از شمار ارجع به گلو درد شوهرش راهنمائی می‌خواهد. شوهر وی یک ماه است دچار گرفتگی صدا شده و با وجود استفاده از دهان شویه‌ها و سایر داروهای OTC بهبودی حاصل نشده است. با علائم گفته شده نامبرده بایستی سریعاً با پزشک تماس بگیرید. گرفتگی و خشن شدن صدا بمدت طولانی دلیل عفونت خفیف گلو نمی‌باشد. باید در نظر داشت که گرفتگی صدای مقاوم می‌تواند علامتی برای بیماریهای حادی مانند سرطان حنجره باشد. معاینه توسط متخصص مربوطه و تشخیص موقع اینگونه بیماریها کمک فراوانی در درمان آنهاست.

گلو حاوی کلرهاگزیدین، هگزیدین، بتادین و باستیل پیریدینینوم کلراید می‌باشد که اثر ضدویروسی ندارند ولی اثر پلاسبوی آنها ممکن است در کاهش ناراحتی مفید باشد.

اسپری‌ها و دهان شویه‌های با اثر بی‌حس کنندگی موضعی در کاهش درد ناشی از قرمزی گلو مفید می‌باشد. قرصهای مکیدنی حاوی مواد بی‌حس کننده می‌تواند به تخفیف گرفتگی صدا و درد کمک کند.

راهنمائی شما در برخورد با بیماران کمک فراوانی به درمان صحیح بیماران خواهد نمود. بطور مثال به ۳ مورد نمونه زیر توجه فرمائید:

۱- مادری به شما مراجعه و در مورد پسر ۱۱ ساله اش راهنمائی می‌خواهد. وی در منزل بستری است و کمی تب دارد لکه‌های سفید روی لوزه‌هایش دیده شده و این سومین بار طی چند ماه اخیر است که به گلو درد مبتلا شده است. اشکال در بلع ندارد و داروئی مصرف نکرده است.

* فرزندوی بایستی توسط پزشک ویزیت شود. تا آن موقع استراحت کامل و تجویز شرب استامینوفن را پیشنهاد کنید. اگر کودک علائم دیگری مانند سرفه یا آبریزش بینی داشته باشد به احتمال قوی عفونت ویروسی بوده و پس از چند روز خود بخود بهبود می‌یابد. گرچه ظاهر گلو در تشخیص عفونتهای ویروسی از باکتریائی کمک چندانی نمی‌کند، قرمزی گلوی حاد همراه با تب و فقدان علائم عفونت ویروسی دلیل بر ابتلاء به عفونت باکتریائی بخصوص در سنین نوجوانی می‌باشد. در صورت