

اثرات سمتی دوز پایین آسپرین به عنوان عامل ضد پلاکتی بر روی معده

ترجمه: محمدرضا جعفرزاده

دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۷۵-۳۲۵ میلی گرم متغیر می‌باشد. مصرف آسپرین به علت افزایش وقوع جراحات مخاطی (زخم، خوردگی یا هر دو) و خونریزی معده می‌تواند زیان بخش باشد. اغلب (بیش از ۶۰ درصد موارد) جراحات ناشی از آسپرین بدون علامت هستند، به خصوص در افراد مسن که متأسفانه گروه اصلی مصرف کنندگان طولانی مدت آسپرین را تشکیل می‌دهند. عدم ظهور علائم، استفاده مداوم آسپرین را موجب شده و خطر خونریزی شدید و ناگهانی را افزایش می‌دهد آیا درمان طولانی مدت با دوز پایین آسپرین هنوز هم برای مخاط معده و دوازدهه زیان آور است؟

یک تحقیق انجام شده هر گونه اختلاف بین مصرف روزانه ۳۲۵ میلی گرم آسپرین را با دارونمادر ایجاد علایم سوء‌هاضمه و زخم معده رد کرد، اما بیمارانی که به طور بالقوه در معرض صدمات معده - روده‌ای بودند از دوره درمان حذف شدند به عبارت دیگر در دو مطالعه گستردگی که در انگلستان انجام شد، خطر نسبی بستره شدن به علت زخم پیتیک در بیماران مصرف کننده دوز ۲۰۰ میلی گرم در روز آسپرین حدود ۲/۶ تا ۳/۹ نشان داده شده است و حتی دوزهای پایین‌تر علی‌رغم کاهش جزئی خطر، (۲/۲ با ۱۵۰ میلی گرم در روز و ۲/۳

خلاصه

دوز پایین آسپرین به طور گستردگی به عنوان عامل ضد پلاکتی در اختلالات قلبی-عروقی به کار می‌رود. آسپرین با دوز (میلی گرم) ۷۵-۳۲۵ روز قابلیت ایجاد آسیب در موکوس معده از طریق القا زخم‌ها یا خوردگی‌های مخاط را دارد، بنابراین محافظت‌های فارماکولوژیک ضروری می‌باشد. تحقیقات طولانی مدت اختصاصی بر روی آنتاگونیست‌های گیرنده H_2 هیستامینی یا سوکرفیت در دسترس نیست، در حالی که اطلاعات حاصل از مطالعه اثر پیشگیری کننده (NSAIDs) داروهای ضد التهاب غیر استروییدی (NSAIDs) بر روی زخم معده نیز نامید کننده است. مطالعات مقدماتی اخیر خاطر نشان می‌کنند که میزوپروستول، به خاطر قابلیت محافظت از مخاط معده و دوازدهه در درمان طولانی مدت با داروهای NSAIDs در برابر مصرف دراز مدت آسپرین با دوز کم هم موثر باشد.

آسپرین (استیل سالسیلیک اسید) به طور گستردگی به عنوان عامل ضد پلاکتی در پیشگیری ثانویه از بیماری انسداد شریانی، و در موارد محدودتر به عنوان عامل پیش‌گیرنده اولیه اختلالات قلبی-عروقی به کار می‌رود. دوزی از دارو که به این منظور تجویز می‌شود، روزانه از

با ۷۵ میلی گرم در روز) بدون توجه به جنس، سن و سابقه قبلی زخم معده و سوء هاضمه باعث ایجاد جراحات معده می شوند.

به نظر می رسد در انگلستان ۱۷ درصد بیماران بالای ۶۰ سال که مبتلا به زخم های خونریزی دهنده هستند، دوز پایین آسپیرین را به عنوان عامل ضد پلاکتی دریافت می کنند. دوز روزانه ۷۵ میلی گرم خطر را تا سقف ۴۰ درصد نسبت به دوز ۳۰۰ میلی گرم در روز کاهش می دهد. با این دوز از نسبت به دوز ۱۵۰ میلی گرم در روز تا ۳۰ درصد خطر خونریزی کاهش پیدا می کند.

این اطلاعات با مشاهدات قبلی مبنی بر این که مصرف کنندگان طولانی مدت آسپیرین در معرض خطر نسبی ابتلا به خونریزی معده به میزان ۲/۱ با مقدار مصرف ۲۵۰ میلی گرم در روز یا کمتر هستند، سازگاری دارد. این امر خاطر نشان می سازد که مقدار مصرف آسپیرین بین ۷۵ میلی گرم تا ۳۰۰ میلی گرم در روز از نظر سمیت معده بی خطر نیست.

در یک تحقیق دو سویه کنترل شده با دارونما، بیماران ۷۰ ساله یا بیشتر دوز ۱۰۰ میلی گرم در روز آسپیرین را به مدت ۱۲ ماه مصرف کردند. گزارشات حاکی از آن است که بروز علائم گوارشی با آسپیرین اندکی بیشتر بود (۱۲ درصد در مقابل ۱۸ درصد) ولی خونریزی آشکار و خونریزی مزمن که با تعیین سطح متوسط هموگلوبین مشخص می شود، در گروه آسپیرین به طور چشمگیر بیشتر بود. حتی با میزان مصرف ۳۰ میلی گرم در روز آسپیرین به نظر می رسد خونریزی گوارشی برابر باشد با مصرف ۲۸۳ میلی گرم آسپیرین در روز. اخیراً در یک تجزیه و تحلیل جانبی آزمایش هایی که در

آن مقدار مصرف متغیر آسپیرین از ۷۵ میلی گرم تا ۳۲۵ میلی گرم در روز به کار رفته، بازنگری شده است. در ۹ تحقیق بررسی شده، بیش از ۱۴۰۰۰ بیمار دوز پایین آسپیرین را مصرف می کردند. میزان اولسپریتیک خونریزی دهنده در مصرف کنندگان آسپیرین در مقایسه با دارونما ۱/۵ برابر بیشتر بود (۰/۰۱ < P). این اعداد و ارقام به میزان قابل توجهی از آنچه در مطالعات کنترل شده بر روی افراد غیر انتخابی گزارش شده بود کمتر است زیرا در آزمایشاتی که پس از آن انجام شد بیمارانی که سابقه قبلی اولسر داشتند به شمار نیامده بودند.

بر طبق تحقیقاتی که بر روی داوطلبان سالم صورت گرفت، مقدار مصرف کمتر از ۲۰ میلی گرم در روز آسپیرین توانایی کاهش ترومبوکسان ۸ سرم را داشته و قادر به مهار عملکرد پلاکت ها بدون کاهش میزان پروستاگلاندین های محافظت کننده سلولی مترشحه از معده می باشد. با وجود این، چنین مقدار مصرفی از آسپیرین می تواند در بهبود آثار بالینی درمان ضد پلاکتی موثر نلقن شود.
۱- اقدامات لازم جهت پیشگیری عمومی: به منظور تعیین راه های ممکن جهت کاهش یا پیشگیری از اثرات گوارشی ناگوار ناشی از درمان ضد پلاکتی، لازم است مکانیسم هایی که از طریق آن آسپیرین باعث آسیب مخاط معده می شود را به طور مختصر مرور کرد. داروهای ضد التهاب غیر استروییدی (NSAIDs) از جمله آسپیرین اثر مسمومیت گاستریک خود را از طریق دو مکانیسم اعمال می کنند. هنگامی که از راه خوراکی تجویز شوند- در اثر تماس مستقیم- باعث آسیب مخاط می شوند. اثر آسپیرین

وابسته به pH است. در pH پایین معده آسپیرین به شکل غیر یونیزه در آمده و به خاطر خاصیت انحلال در چربی خود قادر به نفوذ در سلول‌های اپیتلیال می‌باشد. در اینجا به علت pH بالاتر، دارو یونیزه می‌شود و در داخل سلول‌ها به دام می‌افتد. بنابراین با تغییر نفوذ پذیری سلولی و تقویت انتشار معکوس یون هیدروژن، آسیب بافتی عارض می‌شود.

مکانیسم تخریبی دیگر سیستمیک است و هنگامی رخ می‌دهد که دارو وارد جریان خون عمومی شود، فارغ از این که از چه راهی دارو تجویز شود. مهار سیکلاکسیزناز به همراه کاهش تولید پروستاگلاندین‌های محافظه معده منجر به ضعف عمومی فاکتورهای دفاعی مخاط (ترشح موکوس و بی‌کربنات، جریان خون مخاطی) و اختلال در مواد درگیر در ترمیم بافتی و بهبود دهنده زخم مثل فاکتور رشد ایدرم می‌شود. مهار سیکلاکسیزناز توسط آسپیرین ممکن است فعالیت لیپوakkسیزناز معده را افزایش دهد، که به همراه آن تولید لوکوتین‌های سایتوکسیک و منقبض کننده عروق، انفیلتراسیون نوتروفیل‌های اندوتیلیا و آسیب مخاطی ناشی از ایسکمی موضعی و تولید بیش از حد رادیکال‌های آزاد سمی افزایش می‌یابد.

البته انطباق معده با تکرار مصرف آسپیرین واقع خواهد شد، که علت آن افزایش فعالیت میتوزی، کاهش انفیلتراسیون نوتروفیل و بهبود جریان خون موضعی است. متأسفانه پدیده سازش نسبت به تداوم مصرف آسپیرین که هنوز هم موضوع جنجال برانگیزی به نظر می‌رسد، فقط در تعداد محدودی از بیماران اتفاق می‌افتد و حتی خونریزی‌های مزمن بسیار جزئی هم در طی دوره

درمان بادوز پایین آسپیرین کاهش نمی‌یابد. امکان پیشرفت مسأله سازش معده نسبت به آسپیرین غیر قابل پیش‌گویی است. افراد مسن - که مکانیسم‌های ترمیم بافتی آنها آهسته‌تر است و سیستم مویرگی آنها در مخاطره می‌باشد - احتمال سازش کمتری دارند و متأسفانه این افراد همان کسانی هستند که تحت درمان ضد پلاکتی با آسپیرین می‌باشند علاوه بر این مطابق با تحقیق انجام شده، اختلالات قلبی-عروقی یک عامل خطر مستقل جهت عارضه اولسیرپیتک در طی دوره درمان با NSAIDs می‌باشد.

بر طبق مشاهدات آندوسکوپی مصرف آسپیرین «بافره» سمیت گاستریک دارو را کاهش نداد. در صورتی که فرآورده - Enteric coated از طریق ممانعت از تماس مستقیم دارو با مخاط معده اثرات سودمندی در طی دوره کوتاه مدت تجویز آسپیرین ارایه می‌دهد. با توجه به مشاهدات اخیر امکان این که فرآورده‌های مذکور عوارضی جانبی دراز مدت ناشی از مهار سیستمیک سیکلاکسیزناز را منسخ کنند بسیار ضعیف است بنابراین پیشگیری فارماکولوژیکی ضروری بنظر می‌رسد.

۲- پیشگیری فارماکولوژیک: داروهایی که به صورت نظری جهت پیشگیری از صدمات گوارشی ناشی از آسپیرین به کار می‌روند، یا مهار کننده اسید معده هستند یا عوامل محافظه مخاط معده می‌باشند. بررسی یافته‌های آندوسکوپی داوطلبان سالم در طول یک دوره چند روزه مصرف آسپیرین نشان می‌دهد که هر دو نوع داروها از دارونما موثرترند اما این اطلاعات به ندرت در مورد مصرف طولانی مدت آسپیرین صادق است.

تحقیقات ویژه‌ای که نشانگر احتمال اثر بخشی آنتاکوئیست‌های گیرنده H2 هیستامینی در برابر جراحات معده ناشی از مصرف طولانی مدت آسپیرین باشد در دسترس نیست. با وجود این، آزمایش‌های طولانی مدت با سایر NSAIDs نشان داده است که رانیتیدین با اثر بالقوه در پیش‌گیری از اولسرهای دئوندال ناشی از NSAIDs -مزتیت بر دارونما در پیش‌گیری از پیشرفت جراحات معده ندارد به طوری که بیشتر نخمه‌ای گوارشی توسط آسپیرین القا می‌شوند. مطالعه گسترده‌ای در مورد داروهای مهارکننده پمپ پروتون نیز در دسترس نیست.

سوکرافیت علی رغم خصوصیات بارز گاستروپروتکتیو، نتایج متفاوت و ضعیفی از خود نشان داده است.

در این خصوص یک تحقیق کوتاه مدت نسبی با استفاده از میزوپروستول بر روی داوطلبان مصرف کننده آسپیرین نشان داده است که آنالوگ پروستاگلاندین به طور قابل توجهی در پیش‌گیری از نخم گوارشی ارجحیت دارد. یافته‌ها حاکی از آن است که نتایج آزمایش طولانی مدت ۲ دارو در بیماران مصرف کننده NSAIDs با هم تطابق دارد.

از آنجاکه بخش اساسی اثرات حفاظتی سوکرافیت بر تحریک پروستاگلاندین‌های موضعی تاکید دارد ممکن است توقف سنتز پروستاگلاندین معدنی توسط آسپیرین مسؤول فعالیت ضعیف دارو در این زمینه باشد.

میزوپروستول -آنالوگ آلپروستادیل (PGE1) در پیش‌گیری از صدمات گوارشی ناشی از مصرف کوتاه مدت دوز بالای آسپیرین بر دارونما و سوکرافیت ارجح است. در دراز مدت

میزوپروستول از رانیتیدین و سوکرافیت در پیش‌گیری از نخمه‌ای گاستریک ناشی از NSAIDs بهتر بوده و همچنین به اندازه رانیتیدین در موارد نخم دیودنوم موثر می‌باشد. در بیشتر مطالعات و به ویژه در آزمایش اخیری که در ایالات متحده انجام شده است، فقط از دوز ۲۰۰ میکروگرم دوبار در روز استفاده شد. نتایج حاکی از کاهش گسترده عوارض جانبی میزوپروستول است. موضوع اثر حفاظتی میزوپروستول در برابر درمان دراز مدت با آسپیرین اخیراً در یک مطالعه دو سویه در انگلستان مطرح شده است. نتایج تحقیق هنوز به صورت یک مقاله کامل چاپ نشده است. دوز متفاوت روزانه دارونما با میزوپروستول ۱۰۰ میکروگرمی در داوطلبان سالمی که روزانه ۲۰۰ میلی‌گرم آسپیرین مصرف می‌کردند در طی ۴ هفته مقایسه شده است. ارزیابی اندوسکوپیک از کاهش چشمگیر وقوع نخمه‌ای خونریزی دهنه و غیر خونریزی دهنه در گروه مصرف کنندگان میزوپروستول خبر می‌دهد. به عنوان مثال در گروه مصرف کنندگان میزوپروستول تعداد افراد مبتلا به نخمه‌ای خونریزی دهنه ۴ برابر کاهش یافت و میانگین جراحات در افراد بیش از ۸ برابر کمتر شد ($0.01 < P$). این آزمایش نشان می‌دهد که حتی دوز پایینی از میزوپروستول (به اندازه ۱۰۰ میکروگرم در روز) جهت حفاظت از مخاط معده در برابر جراحات ناشی از آسپیرین دست کم طی دوره میان مدت درمان کافی است.

۳- نتیجه‌گیری: اطلاعات حاصل از مطالعات کنترل شده و گسترده خاطر نشان می‌سازد که آسپیرین حتی در دوزهای پایین -مانند دوزی که به عنوان درمان ضد پلاکتی بکار می‌رود - اثرات زیانباری بر روی مخاط معده و دئوندوم اعمال

آسپیرین هستند باید با میزوپروستول محافظت شوند؟ و برای چه مدت این درمان باید ادامه یابد؟

از جهات نظری کلیه بیماران باید میزوپروستول مصرف کنند. از آنجا که درمان ضد پلاکتی به طور معمول طولانی می‌باشد، پیشگیری باید تا زمان نامحدود ادامه یابد. امکان این امر جهت اهداف عملی به خصوص از نظر اقتصادی ضعیف است. به هر حال بیمارانی که عامل‌های خطر اساسی دارند مثل افراد مسن با سابقه قبلی اولسر باید میزوپروستول را به طور هم زمان با داروهای مذکور دریافت نمایند.

خطر مسمومیت گاستریک در طی ۲ ماهه اول مصرف بیشتر است - بنابراین پیشگیری نباید کمتر از آن طول بکشد - اما فقدان سازش‌پذیری یا انطباق معده بیماران مسن، احتمال حضور خطر را بعد از این مدت به قوت خود باقی نگه می‌دارد.

در حال حاضر دلیلی برای این که درمان بسیار طولانی مدت با میزوپروستول تضمین کننده سلامتی باشد نداریم.

شواهدی که نشان دهد دارو به عنوان عامل پیشگیری کننده در برابر NSAIDs است به ۱۲ ماه محدود می‌شود. (در حال حاضر این مدت به عنوان دوره درمان پیشنهاد می‌شود) اما مطالعات دراز مدت متمرکز بر آسپیرین نیازمند تایید مجدد کارآیی داروی موربد بحث بعد از ۴ هفته اول مصرف می‌باشد.

منبع:

Cuslandi M. Gastric toxicity of antiplatelet therapy with low - dose Aspirin. Drugs. 1997; 53:1 - 5

می‌کند. در مقایسه با مقدار مصرف ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم در روز، به نظر می‌رسد که دوز ۷۵ میلی‌گرم در روز کمترین اثرات گاسترودیوژنال را دارا می‌باشد و بنابراین بر سایرین ارجحیت دارد، ولی به وضوح ثابت شده است که دوز درمانی بی‌خطر آسپیرین با توجه به عارضه جراحت معده وجود ندارد. فرمولاسیون‌های با روکش روده‌ای نشان داده‌اند که فقط در موارد کوتاه مدت تجویز قابل به کاهش مسمومیت گوارشی آسپیرین می‌باشند. فواید این فرمولاسیون‌ها در دراز مدت به اثبات نرسیده است. پیشگیری فارماکولوژیک از زخم‌های گاستریک ناشی از آسپیرین امکان‌پذیر و ضروری می‌باشد.

مهار کننده‌های اسید معده مثل رانیتیدین قادر به پیشگیری از زخم‌های دیوژنال ناشی از NSAIDs می‌باشند ولی در حفاظت از مخاط معده توانایی چندانی ندارند. به عبارت دیگر میزوپروستول در پیشگیری از زخم‌های معده و دیوژنال ناشی از NSAIDs مشهور است، به ویژه در دوره‌های ۴ هفت‌های درمان با دوز پایین آسپیرین محافظت خوبی برای مخاط معده است. به نظر می‌رسد مقدار مصرف بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ میکروگرم در روز به منظور حفاظت از معده و همچنین اثرات ناگوار روده‌ای کافی باشد.

پژشکانی که ناچار به تجویز آسپیرین جهت درمان ضد پلاکتی هستند و از طرفی به خاطر اثرات ناخواسته دارو بر معده نگران می‌باشند باید هنگام پیشگیری فارماکولوژیک این اطلاعات را به حافظه خود بسپارند.

در اینجا دو سؤال بدون جواب باقی می‌ماند: آیا کلیه بیماران که تحت درمان ضد پلاکتی با