



📌 فیناستراید و ناهنجاری‌های جنینی 📌

به اطلاع کلیه همکاران محترم می‌رساند که مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها در آبان ماه سال جاری گزارشی مبنی بر بروز ناهنجاری در جنین و الزام به سقط، متعاقب تجویز قرص فیناستراید در خانم باردار، دریافت داشته است. جهت جلوگیری از بروز حوادث مشابه، توجه همکاران محترم را به نکات زیر جلب می‌نماییم.

- ۱ - فیناستراید مهارکننده ۵ - آلفا - ردوکتاز نوع ۲ می‌باشد و از این طریق تبدیل تستوسترون به دی‌هیدروتستوسترون (فرم فعال هورمون) را مهار می‌کند.
- ۲ - سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) کاربرد فیناستراید را در درمان هیپرپلازی پروستات و آلپسی آندروژنیک در مردان تایید نموده است ولی استفاده از این دارو در هیرسوتیسم زنان مورد تایید FDA نمی‌باشد.
- ۳ - فیناستراید از طریق مهار تبدیل تستوسترون به دی‌هیدروتستوسترون ممکن است باعث ایجاد اختلال در دستگاه تناسلی خارجی جنین پسر گردد.
- ۴ - فیناستراید در خانم‌های باردار یا خانم‌هایی که قصد باردار شدن دارند منع مصرف مطلق دارد.
- ۵ - خانم‌های باردار باید از تماس با قرص‌های خرد شده فیناستراید اجتناب ورزند.
- ۶ - استفاده از فیناستراید به‌عنوان داروی خط اول درمان هیرسوتیسم در خانم‌های جوان به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود و در صورت الزام به مصرف حتماً باید از راه‌های مطمئن برای پیشگیری از بارداری استفاده شود.

از همکاران محترم تقاضا می‌گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه از داروی مذکور، مراتب را از طریق ارسال فرم‌های زرد و یا با تماس تلفنی (۲۳ ۴۲ ۴۰ ۶۶) به مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها گزارش نمایند.

Reference:

1. American Hospital Formulary Service (AHFS) Drug Information 2005.
2. Micromedex® 2004

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها، دبیرخانه تحقیقات کاربردی - معاونت غذا و دارو
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی